

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要卷一萬四百三十七

子部

黃帝內經素問卷十一

唐王冰次注

宋林億等校正

舉痛論

腹中論

刺腰痛篇

舉痛論篇第三十九

新校正云按全元起本在第三卷名五藏舉痛所以名舉痛之義未

詳按本篇乃黃帝問五藏卒痛之疾疑舉乃卒字之誤也

黃帝問曰余聞善言天者必有驗於人善言古者必有

合於今善言人者必有厭於己如此則道不惑而要數

極所謂明也

善言天者言天四時之氣溫涼寒暑生長收藏在人形氣五藏參應可驗而指示善

惡故曰必有驗於人善言古者謂言上古聖人養生損益之道與今養生損益之理可合而與論成敗故曰必

有合於今也善言人者謂言形骸骨節更相枝拄筋脈束絡皮肉包裹而五藏六腑次居其中假七神五藏而

運用之氣絕神去則之於死是以知彼浮形不能堅久靜慮於己亦與彼同故曰必有厭於己也夫如此者是

知道要數之極悉無疑惑深明至理而乃能然矣

今余問於夫子令言而可知

視而可見捫而可得令驗於己而發蒙解惑可得而聞

乎言如發開童蒙之耳解於疑惑者之心令一條理而目視手循驗之可得捫猶循也 岐伯再

拜稽首對曰何道之問也

請示問端也

帝曰願聞人之五藏卒痛

何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而

稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒

然而痛帝曰其痛或卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不

可按者或按之而痛止者或按之無益者或喘動應手者

或心與背相引而痛者或脇肋與少腹相引而痛者或腹

痛引陰股者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知人有

少間復生者或痛而嘔者或腹痛而後泄者或痛而閉不

通者凡此諸痛各不同形別之柰何

欲明異候之所起

歧伯曰寒

氣客於脈外則脈寒脈寒則縮踈縮踈則脈絀急絀急則外引

小絡故卒然而痛得炅則痛立止

脈左右環故得寒則縮踈而絀急縮踈絀

急則衛氣不得流通故外引於小絡脈也衛氣不入寒內薄之脈急不縱故痛生也得熱則衛氣復行寒氣退

辟故痛止炅熱也止已也

因重中於寒則痛久矣

重寒難釋故痛久不消

寒氣客

於經脈之中與炅氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也

按之痛甚

者其義具下文

寒氣稽留炅氣從上則脈充大而血氣亂故痛甚不

可按也

則脈既滿大血氣復亂按之則邪氣攻內故不可按也

寒氣客於腸胃之間

膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按

之痛止

膜謂鬲間之膜原謂鬲育之原血不得散謂鬲

生也手按之則寒氣散小絡緩故痛止

寒氣客於俠脊之脈則深按之不

能及故按之無益也

俠脊之脈者當中督脈也次兩傍足太陽脈也督脈者循脊裏太陽

者貫脊筋故深按之不能及也若按當中則脊節曲按兩傍則脊筋盛合曲與盛合皆衛氣不得行過寒氣益

聚而內畜故按之無益

寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上

寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手矣

衝脈

奇經脈也。闕元穴名在齊下三寸，言起自此穴，即隨腹而上，非生出於此也。其本生，出乃起於腎下也。直上者，謂上行會於咽喉也。氣因之，謂衝脈不通，足少陰氣因之上滿，衝脈與少陰並行，故喘動應於手也。寒氣客於背俞之脈，則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛。其俞注

於心，故相引而痛。按之則熱，氣至熱，氣至則痛止矣。俞

謂心俞，脈亦足太陽脈也。夫俞者，皆內通於藏，故曰其俞注於心，相引而痛也。按之則溫，氣入溫，氣入則心氣

外發，故寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於

肝，寒氣客於脈中，則血泣，脈急，故脇肋與少腹相引痛。

矣。厥陰者，肝之脈，入髦中環陰器，抵少腹，上貫肝鬲，布脇肋，故曰絡陰器繫於肝，脈急引脅與少腹痛也。

厥氣客於陰股寒氣上及少腹血泣在下相引故腹痛

引陰股

亦厥陰肝脈之氣也以其脈循陰股入髦中環陰器上抵少腹故曰厥氣客於陰股寒氣上及

於少腹也寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注

於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

言血為寒氣之所凝

結而乃成積

寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故

卒然痛死不知人氣復反則生矣

言藏氣被寒擁胃而不行氣復得通則已

也新校正云詳注中擁胃疑作擁胃

寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而

嘔也

腸胃客寒留止則陽氣不得下流而反上行寒氣寒不去則痛生陽上行則嘔噦故痛而嘔也



客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣

小腸為受盛之府中滿則

寒邪不居故不得結聚而傳下入於迴腸迴腸廣腸也為傳導之府物不得傳留故後泄而痛熱氣留

於小腸腸中痛瘕熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不

通矣

熱滲津液故便堅也

帝曰所謂言而可知者也視而可見柰

何謂也歧伯曰五藏六府固盡有部

謂面上分部視其五色

黃赤為熱

中熱則色黃赤

白為寒

陽氣少血不上榮於色故白

青黑為痛

凝

泣則變惡故此所謂視而可見者也帝曰捫而可得柰

色青黑則痛

何捫摸也

以手循摸也

歧伯曰視其主病之脈堅而血及陷下者

皆可捫而得也帝曰善余知百病生於氣也

夫氣之為用虛實逆

順緩急皆能為病故發此問端怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣

下寒則氣收炆則氣泄驚則氣亂

新校正云按太素驚作憂

勞則氣

耗思則氣結九氣不同何病之生岐伯曰怒則氣逆甚

則嘔血及飧泄

新校正云按甲乙經及太素飧泄作食而氣逆

故氣上矣

怒則陽氣

逆上而肝氣乘脾故甚則嘔血及飧泄作何以明其然怒則面赤甚則色蒼靈樞經曰盛怒而不止則傷志明

怒則氣逆上而不下也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣

氣脈和調

故志達暢榮衛通利故氣徐緩悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮

衛不散熱氣在中故氣消矣

布葉謂布蓋之大葉

新

而上焦不通作兩焦不通又王注肺布葉舉謂布蓋之大葉疑非全元起云悲則損于心心系急則動於肺肺

氣繫諸經逆故肺布而葉舉安得謂肺布為肺布蓋之大葉恐則精却却則上焦閉

閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣

恐則陽精却上而不下流故却則上

焦閉也上焦既閉氣不行流下焦陰氣亦還迴不散而聚為脹也然上焦固禁下焦氣還各守一處故氣不行

也新校正云詳氣寒則腠理閉氣不行故氣收矣謂腠

不行當作氣下行也津液滲泄之所理謂文理逢會之中閉謂密閉氣謂衛

氣行謂流行收謂收斂也身寒則衛氣沈故皮膚文理及滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收斂於中而不發散也新校正云按甲乙經氣不行作營衛不行

炁則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄

人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠

開發榮衛大通津液外添而汗大泄也

驚則心無所倚神無所歸慮無所

定故氣亂矣

氣奔越故不調理校正云按太素驚作憂

新勞則喘息汗出外

內皆越故氣耗矣

疲力役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出然喘且汗出內外皆

踰越於常紀故氣耗損也

思則心有所存神有所歸正氣留而不行

故氣結矣

繫心不散故氣亦停留云按甲乙經歸正二字作止字

新校正

腹中論篇第四十

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰有病心腹滿旦食則不能暮食此為何病歧

伯對曰名為鼓脹

心腹脹滿不能再食形如鼓脹故名

鼓脹也新校正云按太素鼓作裁

帝曰治之奈何歧伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已

按古本草雞矢並不治鼓脹惟大利小便微寒今方制法當取用處湯漬服之

帝曰其時有復

發者何也

復謂再發言如舊也

歧伯曰此飲食不節故時有病也

雖然其病且已時故當病氣聚於腹也

飲食不節則傷胃胃脈者循腹

裏而下行故飲食不節時有病者復病氣聚於腹中也

帝曰有病胸脇支滿者妨

於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩

時時前後血病名為何何以得之

清液清水也亦謂之清涕清涕者謂從竅

漏中漫液而下水出清冷也眩謂目視眩轉也前後血謂前陰後陰出血也

歧伯曰病名血

枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷

故月事衰少不來也

吐血多者謂之脫血漏下鼻衄嘔

脈盛則內熱因而入房髓液皆下故腎中氣竭也肝藏血以少大脫血故肝傷也然於丈夫則精液衰乏女子

則月事衰少而不來帝曰治之奈何復以何術歧伯曰以四烏鰂

骨一蘆茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為

後飯飲以鮑魚汁利腸中

新校正云按別本一作傷中

及傷肝也

後飯

藥先謂之後飯按古本草經云烏鰂魚骨蘆茹等並不治血枯然經法用之是攻其所生所起爾夫醉勞力以

入房則腎中精氣耗竭月事衰少不至則中有惡血淹留精氣耗竭則陰萎不起而無精惡血淹留則血痺著中而不散故先茲四藥用入方焉古本草經曰烏鰂魚骨味鹹冷平無毒主治女子血閉蘊茹味辛寒平有小毒主散惡血雀卵味甘溫平無毒主治男子陰痿不起強之令熱多精有子鮑魚味辛臭溫平無毒主治瘀血血痺在四支不散者尋文會意方義如此而處治之也

新校正云按甲乙經及太素蘊茹作藺茹詳王注性味

乃藺茹當改蘊作藺又按本草烏鰂魚骨冷作微溫雀卵甘作酸與王注異

帝曰病有少腹

盛上下左右皆有根此為何病可治不歧伯曰病名曰

伏梁

伏梁心之積也

新校正云詳此伏梁與心積之伏梁大異病有名同而實異者非一如此之類是

也帝曰伏梁何因而得之歧伯曰裏大膿血居腸胃之

外不可治治之每切按之致死帝曰何以然歧伯曰此

下則因陰必下膿血上則迫胃脘生馬俠胃脘內癰當正

衝脈帶脈之部分也帶脈者起於季脇迴身一周橫絡於齊下衝脈者與足少陰之絡起於腎下出於氣街循

陰股其上行者出齊下同身寸之三寸闕元之分俠齊直上循腹各行會於咽喉故病當其分則少腹盛上下

左右皆有根也以其上下堅盛如有潛梁故曰病名伏梁不可治也以裏大膿血居腸胃之外按之痛悶不堪

故每切按之致死也以衝脈下行者絡陰上行者循腹故也上則迫近於胃脘下則因薄於陰器也若因薄於

陰則便下膿血若迫近於胃則病氣上出於馬復俠胃脘內長其癰也何以然哉以本有大膿血在腸胃之外

故也生當為出傳文誤也新此久病也難治居齊上校正云按太素俠胃作使胃



為逆居齊下為從勿動亟奪

若裏大膿血居齊上則漸傷心藏故為逆居齊下則

去心稍遠猶得漸攻故為從從順也亟數也奪去也言不可移動但數數去之則可矣

論在刺法

中

今經

帝曰人有身體髀股骭皆腫環齊而痛是為何

病岐伯曰病名伏梁

此二十六字錯簡在奇病論中若不有此二十六字則下大無據也

新校正云詳此並無注解盡在下卷奇病論中此風根也

此四字此篇本有其奇病論中亦有之

氣溢於大腸而著於育育之原在齊下故環齊而痛也

不可動之動之為水溺瀦之病

亦衝脈也齊下謂腓腓在齊下同身寸之二寸

半靈樞經曰育之原名曰腓腓

帝曰夫子數言熱中消中不可服高梁

芳草石藥石藥發瘕芳草發狂

多飲數溲謂之熱中多食數溲謂之消中多喜

曰瘕多怒曰狂芳美味也

夫熱中消中者皆富貴人也今禁高粱是

不合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其說

者熱中消中者脾氣之

上溢甘肥之所致故禁食高粱芳美之草也通評虛實論曰凡治消瘕甘肥貴人則高粱之疾也又奇病論曰

夫五味入於口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥

也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為消渴此之謂也夫富貴人者驕恣縱欲輕人而無能禁之

禁之則逆其志順之則加其病帝思難詰故發問之高膏粱米也石藥英乳也芳草濃美也然此五者富貴人

常服之難禁也歧伯曰夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣

急疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者

脾氣溢而生病氣美

則重盛於脾消熱之氣躁疾氣悍則又滋其熱若人性

和心緩氣候舒勻不與物爭釋然寬泰則神不躁迫無

懼內傷故非緩心和人不可以服此二者悍利也堅定

也固也勁剛也言其芳草石藥之氣堅定固久剛烈而

卒不歇滅此帝曰不可以服此二者何以然歧伯曰夫

熱氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾慄疾脾者土

也而惡木服此藥者至甲乙日更論內熱氣慄盛則木氣則躁怒數起躁怒數起則熱氣因木以傷脾帝曰善有

病膺腫乙經作癰腫頸痛胸滿腹脹此為何病何以

得之

膺胸傍也頸項前也胸膺間也

歧伯曰名厥逆

氣逆所生故名厥逆

帝曰治

之柰何歧伯曰灸之則瘖石之則狂須其氣并乃可治

也

石謂以石鍼開破之

帝曰何以然歧伯曰陽氣重上有餘於上

灸之則陽氣入陰入則瘖石之則陽氣虛虛則狂

則灸之

氣助陽陽盛故入陰石之則陽氣出陽氣出則內不足故狂

須其氣并而治之可使

全也

并謂并合也待自并合則兩氣俱全故可治若不爾而灸石之則偏致勝負故不得全而瘖狂也

帝曰善何以知懷子之且生也歧伯曰身有病而無邪

脈也

病謂經閉也脈法曰尺中之脈來而斷絕者經閉也月水不利若尺中脈絕者經閉也今病經閉脈

反如常者婦人妊娠之證  
故云身有病而無邪脈

帝曰病熱而有所痛者何也

歧伯曰病熱者陽脈也以三陽之動也人迎一盛少陽

二盛太陽三盛陽明入陰也夫陽入於陰故病在頭與

腹乃臍脹而頭痛也帝曰善

新校正云按六節藏象論云人迎一盛病在少陽二

盛病在太陽三盛病在陽明與此論同又按甲乙經三盛陽明無入陰也三字

刺腰痛篇第四十一

新校正云按全元起本在第六卷

足太陽脈令人腰痛引項脊尻背如重狀

足太陽脈別下項循肩髃

內俠脊抵腰中別下貫髀故令人腰痛引項脊尻背如重狀也  
新校正云按甲乙經貫髀作貫臍刺瘡注亦

作貫脾三部九  
候注作貫腎

刺其郄中太陽正經出血春無見血

中郄

委中也在膝後屈處臑中央約文中動脈足太陽脈之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三

壯太陽合腎腎王於冬水  
衰於春故春無見血也

少陽令人腰痛如以鍼刺其

皮中循循然不可以俛仰不可以顧

足少陽脈遠髻際橫入髀厭中故令

腰痛如以鍼刺其皮中循循然不可以俛仰少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手陽明之前至肩上交出手少陽之後其支別者目銳眥下入大迎合手少陽於頰下加頰車下頸合缺盆故不可以顧

新校

正云按甲乙經行手陽明之前作行手少陽之前也

刺少陽成骨之端出血成骨

在膝外廉之骨獨起者夏無見血

成骨謂膝外近下斷骨上端兩起骨相並

間陷容指者也。斷骨所成柱膝髀骨故謂之成骨。陽明也。少陽合肝肝王於春木衰於夏故無見血也。

令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲。足陽明脈起於

鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆又其支別者起胃口下循腹裏至氣街中而合以下刺髀故令人腰痛不可顧顧如有見者陽虛故悲也。

陽明於斷前三痛上下和之出血秋無見血。按內經中

經陽明脈穴俞之所主此腰痛者悉刺斷前三痛則正三里穴也三里穴在膝下同身寸之三寸斷骨外廉兩

筋肉分間刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯陽明合脾脾王長夏土衰於秋故秋無見血新

校正云按甲足少陰令人腰痛痛引脊內廉足少陰脈乙經斷作斷足少陰令人腰痛痛引脊內廉上股內後

廉貫脊屬腎故令人腰痛引脊內廉也新校正云按全元起本脊內廉作脊內痛太素亦同此

陰腰痛證并刺足太陰法應古文脫簡也

刺少陰於內踝上二脗春無見血

出血太多不可復也

按內經中誥流注圖經少陰脈穴俞所主此腰痛者當刺內踝上則

正復溜穴也復溜在內踝後上同身寸之二寸動脈陷者中刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯

厥陰之脈令人腰痛腰中如張弓弩弦

足厥陰脈自陰股環陰器抵少

腹其支別者與太陰少陽結於腰髀下俠脊第三第四骨空中其穴即中膠下膠故腰痛則中如張弓弩之弦

也如張弦者刺厥陰之脈在腓踵魚腹之外循之累累言強急之甚

然乃刺之

腓踵者言脈在腓外側下當足跟也腓形勢如卧魚之腹故曰魚腹之外也循其分肉有



血絡累累然乃刺出之此正當蠱溝穴分足厥陰之絡  
在內踝上五寸別走少陽者刺可入同身寸之二分留  
三呼若灸者可灸三壯厥陰一經作居陰是傳寫草書  
厥字為居也 新校正云按經云厥陰之脈令人腰痛  
次言刺厥陰之脈注言刺厥陰之絡經  
注相違疑經中脈字乃絡字之誤也 其病令人善言  
默默然不慧刺之三疝 厥陰之脈循喉嚨之後上入頰  
則昏冒故不爽慧也三刺其處腰痛乃除 新校正云  
按經云善言默默然不慧詳善言與默默二病難相兼  
全元起本無善字於義為允又按甲乙經厥陰之脈不  
絡舌本王氏於素問之中五處引注而注厥論與刺熱  
及此三篇皆云絡舌本注風論注痺論二解脈令人腰  
篇不言絡舌本蓋王氏亦疑而兩言之也 解脈令人腰  
痛痛引肩目眈眈然時遺洩 解脈散行脈也言不合而  
別行也此足太陽之經起

於目內眥上額交巔上循肩髃俠脊抵腰中入循膂絡  
腎屬膀胱下入膈中故病斯候也又其支別者從膂內  
別下貫脾循髀外後廉而下合於膈  
刺解脈在膝筋肉  
中兩脈如繩之解股故名解脈也

分間郄外廉之橫脈出血血變而止  
膝後兩傍大筋雙  
上股之後兩筋之

間橫文之處努肉高起則郄中之分也古中誥以膈中  
為太陽之郄當取郄外廉有血絡橫見迢然紫黑而盛  
滿者乃刺之當見黑血必候其血色變赤乃止血不  
赤極而寫之必行血色變赤乃止此太陽中經之為腰  
痛解脈令人腰痛如引帶常如折腰狀善恐  
足太陽之  
也解脈令人腰痛如引帶常如折腰狀善恐  
別脈自肩  
而別下循背脊至腰而橫入髀外後廉而下合膈中故  
若引帶如折腰之狀  
新校正云按甲乙經如引帶作  
如裂善恐  
刺解脈在郄中結絡如黍米刺之血射以黑  
作善怒也

見赤血而已

郄中央則委中穴足太陽合也在膝後屈處

分留七呼若灸者可灸三壯此經刺法也今則取其結絡大如黍米者當黑血箭射而出見血變赤然可止也

新校正云按全元起云有兩同陰之脈令人腰痛痛如解脈病源各異恐誤未詳

小錘居其中怫然腫足少陽之別絡也並少陽經上行去足外踝上同身寸之五寸乃別

走厥陰並經下絡足跗故曰同陰脈也怫怒也言刺同腫如嗔怒也 新校正云按太素小錘作小鍼 刺同

陰之脈在外踝上絕骨之端為三痛絕骨之端如前同身寸之三分陽輔

穴也足少陽脈所行刺可入同身寸 陽維之脈令人腰

痛痛上怫然腫陽維起於陽則太陽之所 刺陽維之脈

脈與太陽合腠下間去地一尺所

行太陽所生與正經並

太陽合而上也腠下去地正同身寸之一尺是則承光

穴在銳腠腸下肉分間陷者中刺可入同身寸之七分

若灸者可灸五壯以其取腠腸下肉分間故云合腠下

間新校正云按穴之所在乃承山穴非承光也山字

誤為衡絡之脈令人腰痛不可以俛仰仰則恐仆得之

舉重傷腰衡絡絕惡血歸之

自衡橫也謂太陽之外也絡

下與中經合於腠中者今舉重傷腰則橫絡絕中經獨

盛故腰痛不可以俛仰矣一經作衡絕之脈傳寫魚魯

之誤也若是衡脈中詰不應刺之在郄陽筋之間上郄

取太陽脈委陽殷門之穴也

數寸衡居為二痛出血

橫居二穴謂委陽殷門平視橫相當也郄陽謂浮郄穴上側委

陽穴也筋之間謂膝後腘上兩筋之間殷門穴也二穴各去髀下橫文同身寸之六寸故曰上郤數寸也委陽

刺可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壯殷門刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯故曰

衡居為二痛新校正云詳王氏云浮郤穴上一寸不得言上側也穴也按甲乙經委陽在浮郤穴下一寸不得言上側也

會陰之脈令人腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲

飲已欲走足太陽之中經也其脈循腰下會於後陰故曰會陰之脈其經自腰下行至足今陽氣大

盛故痛上漯然汗出汗液既出則腎燥陰虛故汗乾令人欲飲水以救腎也水入腹已腎氣復生陰氣流行太

陽入盛故飲水已反欲走也刺直陽之脈上三痛在蹻上郤下五寸

橫居視其盛者出血直陽之脈則太陽之脈俠脊下貫髀下至腘中下循腓過外踝之

後條直而行者故曰直陽之脈也。蹻為陽蹻所生申脈  
穴在外踝下也。郤下則臑下也。言此刺處在臑下同身  
寸之五寸上承郤中之穴下當申脈之位是謂承筋穴  
即臑中央如外陷者中也。太陽脈氣所發禁不可刺可  
灸三壯。今云刺者謂刺其血絡之盛滿者也。兩臑皆有  
太陽經氣下行當視兩臑中央有血絡盛滿者乃刺出  
之。故曰視其盛者出血。新校正云詳上云會陰之脈  
令人腰痛此云刺直陽之脈者詳此直陽之脈即會陰  
之脈也。文變而事則不殊。又承筋穴注云臑中  
央如外按甲乙經及骨空論注無如外二字。飛陽之  
脈令人腰痛痛上怫怫然甚則悲以恐。是陰維之脈也。  
寸之五寸臑分中並少陰經而上也。少陰之脈前則陰  
維脈所行也。足少陰之脈從腎上貫肝鬲入肺中循喉  
嚨俠舌本其支別者從肺出絡心注胸中故刺飛陽之  
甚則悲以恐也。恐者生於腎悲者生於心。

脈在內踝上五寸

臣億等按甲少陰之前與陰維之會

內踝後上同身寸之五寸復溜穴少陰脈所行刺可入

同身寸之三分內踝之後築賓穴陰維之郄刺可入同

身寸之三分若灸者可灸五壯少陰之前陰維之會以

三脈會在此穴位分也刺可入同身寸之三分若灸者

可灸五壯今中誥經文正同此法臣億等按甲乙經足

太陽之絡別走少陰者名曰飛揚在外踝上七寸又云

築賓陰維之郄在內踝上腓分中復溜穴在內踝上二

寸今此經注都與甲乙不合者疑經注中五寸字當作

二寸則素問與昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眴眴然

甲乙相應矣

甚則反折舌卷不能言

陰蹻脈也陰蹻者足少陰之別

也起於然骨之後上內踝之上

直上循陰股入陰而循腹上入胸裏入缺盆上出人迎

之前入頤內廉屬目內眥合於太陽陽蹻而上行故腰

痛之狀  
如此

刺內筋為二痛在內踝上大筋前太陰後上踝

二寸所

內筋謂大筋之前分肉也太陰後大筋前即陰

陰前太陰後筋骨之間陷者之中刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三壯今中語經文正主此散

脈令人腰痛而熱熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚

則遺洩

散脈足太陰之別也散行而上故以名焉其脈循股內入腹中與少陰少陽結於腰髀下骨空

中故病則腰下如有橫木居其中甚乃遺洩也刺散脈在膝前骨肉分間絡外

廉束脈為三痛

謂膝前內側也骨肉分謂膝內輔骨之下下廉腓肉之兩間也絡外廉則太陰

之絡色青而見者也輔骨之下後有大筋擷束膝前之骨令其連屬取此筋骨繫束之處脈以去其病是曰地



機三刺而已故曰肉里之脈令人腰痛不可以欬欬則束脈為之三痛也

筋縮急

肉里之脈少陽所生則陽維之脈氣所發也里裏也

刺肉里之脈為二痛

在太陽之外少陽絕骨之後

分肉主之一經云少陽絕骨之前傳寫誤也絕骨之

前足少陽脈所行絕骨之後也分肉穴在足外踝直上絕骨

之端如後同身寸之二分筋肉分間陽維脈氣所發刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯

新校

正云按分肉之穴甲乙經不見與氣穴注兩出而分寸不同氣穴注二分作三分五分作三分十呼作七呼

腰痛俠脊而痛至頭几几然目眈眈欲僵仆刺足太陽

郄中出血

郄中委中按太素作頭沈沈然

腰痛上寒刺足太陽

陽明上熱刺足厥陰不可以俛仰刺足少陽中熱而喘

刺足少陰刺郄中出血

此法玄妙中誥不同莫可窺測當用知其應不爾皆應先去血

絡乃調之也

腰痛上寒不可顧刺足陽明

上寒陰市主之陰市在膝上同身寸

之三寸伏兔下陷者中足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯不可顧三里主之

三里在膝下同身寸之三寸肘外廉兩筋肉分間足陽明脈之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者

可灸三壯上熱刺足太陰地機主之地機在膝下同身寸之五寸足太陰之郄也刺可入同身

寸之三分若灸者可灸三壯中熱而喘刺足少陰涌泉

新校正云按甲乙經作五壯

太鍾

悉主之涌泉在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸

三壯太鍾在足跟後街中動脈足少陰之絡刺可入同  
身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯新校正云按  
刺瘡注太鍾在內踝後街中水穴論注在內踝後此注  
在跟後街中動脈三注不同甲乙經亦云跟後衝中當  
從甲乙大便難刺足少陰涌泉少腹滿刺足厥陰太衝  
經為正  
在足大指本節後內間同身寸之二寸陷者中脈動應  
手足厥陰脈之所注也刺可入同身寸之三分留十呼  
若灸者可如折不可以俛仰不可舉刺足太陽如折束  
灸三壯  
不可以俛仰京骨崑崙悉主之不可舉申脈僕參悉主  
之束骨在足小指外側本節後赤白肉際陷者中足太  
陽脈之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者  
可灸三壯京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按  
而得之足太陽脈之所過也刺可入同身寸之三分留  
七呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後跟骨上陷者

中細脈動應手足太陽脈之所行也刺可入同身寸之  
五分留十呼若灸者可灸三壯申脈在外踝下同身寸  
之五分容爪甲陽蹻之所生也刺可入同身寸之六分  
留十呼若灸者可灸三壯僕參在跟骨下陷者中足太  
陽陽蹻二脈之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸  
者可灸三壯新校正云按甲乙經申脈在外踝下陷  
者中無五分字刺入六分作三分留十呼作留六  
呼氣穴注作七呼僕參留七呼甲乙經作六呼引脊

內廉刺足少陰

復溜主之取同飛陽注從腰痛上寒不  
可顧至此件經語除注並合朱書新

校正云按全元起本及甲乙經并太素自腰痛上寒至  
此並無乃王氏所添也今注云從腰痛上寒至此並合

朱書十九字非王冰腰痛引少腹控眇不可以仰新校  
正云

之語蓋後人所加也

按甲乙經作刺腰尻交者兩髀腫上以月生死為痛數  
不可以俛仰

發鍼立已

此邪客於足太陰之絡也。控通引也。眇謂季

傍四骨空。左右八穴。俗呼此骨為八髎骨也。此腰痛取

腰髎下第四髎。即下髎穴也。足太陰厥陰少陽三脈左

右交結於中。故曰腰尻交者也。兩髎。髎謂兩髎骨下堅

起肉也。髎上非髎之上。巔正當刺髎肉矣。直刺髎肉。即

脾上也。何者。脾之上巔。別有中脊肉。俞白環俞。雖並主

腰痛。考其形證。經不相應矣。髎骨即腰脊兩傍起骨也。

俠脊兩傍腰髎之下。各有脾肉。隴起而斜趨於髎骨之

後。內承其髎。故曰兩髎。脾也。下承髎。脾肉左右兩脾各

有四骨空。故曰上髎。次髎。中髎。下髎。上髎當髎骨下陷

者。中餘三髎。少斜下。按之陷中是也。四空。悉主腰痛。唯

下髎所主。文與經同。即太陰厥陰少陽所結者也。刺可

入同。身寸之二寸。留十呼。若灸者。可灸三壯。以月生。死

為痛數者。月初向圓。為月生。月半向空。為月死。月死

少生。月刺多。繆刺論曰。月生一日一痛。二日二痛。漸多。

之十五日十五痛十六日十四痛  
漸少之其痛數多少如此即知也  
左取右右取左左痛在  
取右痛在右針取左所以然者以其脈左右交結於尻  
骨之中故也新校正云詳此腰痛引少腹一節與繆

重刺論

黃帝內經素問卷十一

黃帝內經素問卷十一音釋

舉痛論泣而

音

絀急

骨上丁切

腹中論鰓

昨則切

蘆茹

上力切

下音如腠

上蒲沒切下烏朗切

瘡

陰音

刺胛痛論厭

於切

髀

苦瓦切

膠

音

踣踵

丑切

用

蟲溝

上盧啟切又落戈切

嘿

音

小錘

直垂切

漯

他合切

髌

梧嫁切

顛

虎結切

眇

亡表切



黃帝內經素問卷十一音釋

謹案卷十第四頁前八行邪氣之所合則其府也

按吳崐本合作舍

第五頁後三行未可治也按張志聰本治作刺

第九頁前六行俠谿在足小指次指歧骨間刊本

政訛政據氣穴論注改

第十二頁前三行背俞謂大杼按水熱穴論注以

風門熱府為背俞刺熱論注謂明堂中誥圖經  
不言背俞未詳何處此及氣穴論注又以大杼

為背俞注說凡三異附識于此

第十三頁前三行相去各同身寸之一寸半刊本一訛二據刺熱論注改

第十四頁前五行按全元起本刊本元訛示今改  
第十六頁後八行肉裂則痛刊本肉訛內據痺論注改

第十七頁前七行按甲乙經刊本甲訛用今改  
第十七頁後五行屬腎刊本腎訛月又從肩髃內

別下刊本膊訛不並據靈樞經改

第十七頁後八行入缺盆刊本缺訛夫據靈樞經  
改

第十八頁前一行絡脾刊本絡訛各據靈樞經改  
第十八頁前二行肝與膽合又膽之脉從缺盆以  
下胸中刊本膽訛斗脉訛永並據經文及靈樞  
經改

第十八頁前六行又小腸脉入缺盆絡心刊本脉

訛永缺訛夫各訛絡並據經文及靈樞經改

第十八頁後五行關於肺也刊本關於訛閉又故使  
人多涕唾刊本多涕唾訛作子又抵又腹滿不  
欲食者刊本腹訛月並據經文改

卷十一第二頁後三行則外引小絡按吳崐本則  
字上有絀急二字

第四頁後五行固盡有部按吳崐本固作面以注  
文推之似作面字為是

第六頁前四行氣奔速則陽外發刊本缺發字據  
別本補

第七頁後五行烏鰂魚骨刊本鰂訛二據經文及  
本草改

第九頁前四行甘肥貴人按通評虛實論無甘字  
第十三頁後五行小錘作小鍼刊本錘訛中據經  
文改


第十四頁前一行太陽所生刊本生訛主據李時

珍奇經八脉考所引王永注改

第十五頁後七行起於然骨之後按靈樞經及奇經八脉考然骨並作然谷

音釋第一頁前二行鰾昨則切刊本鰾字訛作則魚二字據本篇文改

第一頁前四行嘿音墨刊本墨訛黑據集韻改



總校官候補中書臣吳紹潔

校對官庶吉士臣何思鈞

謄錄監生臣茹灃



欽定四庫全書薈要

子部

內經素問卷十二至  
四

詳校官主事臣陳本



欽定四庫全書薈要卷一萬四百三十八子部

黃帝內經素問卷十二

唐王冰次註

宋林億等校正

  
風論

痺論

痿論

厥論

風論篇第四十二

新校正云按全元起本在第九卷

黃帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中

或為癘風或為偏枯或為風也其病各異其名不同或

內至五藏六府不知其解願聞其說傷謂人岐伯對曰

風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄腠理開疎則邪風入風氣

入已玄府閉封故內不得通外不得泄也風者善行而數變腠理開則洒然

寒閉則熱而悶洒然寒貌悶不爽貌腠理開則風其寒

也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人怵慄而不能食

名曰寒熱寒風入胃故食飲衰熱氣內藏故消肌肉寒熱相合故怵慄而不能食名曰寒熱也怵慄

卒振寒貌新校正云詳怵慄全風氣與陽明入胃循

元起本作失味甲乙經作解風氣與陽明入胃循

脉而上至目內皆其人肥則風氣不得外泄則為熱中

而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而泣出

陽明者胃脉也胃脉

起於鼻交頰中下循鼻外入上齒中還出俠口環脣下  
交承漿却循頤後下廉循喉嚨入缺盆下膈屬胃故與  
陽明入胃循脉而上至目內皆也人肥則腠理密緻故不  
得外泄則為熱中而目黃人瘦則腠理開疎風得外泄  
則寒中而  
泣出也風氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間

與衛氣相干其道不利故使肌肉憤膜而有瘍衛氣有

所凝而不行故其肉有不仁也

肉分之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行於肉

分之間故氣道澀而不利也氣道不利風氣內攻衛氣  
相持故肉憤膜而瘡出也瘍瘡也若衛氣被風吹之不

得流轉所在偏併凝而不行則肉有不  
仁之處也不仁謂痹而不知寒熱痛癢  
癰者有榮氣熱

肘其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰

吹則風入於經

脉之中也榮行脉中故風入脉中內攻於血與榮氣合  
合熱而血肘壞也其氣不清言潰亂也然血脉潰亂榮  
復挾風陽脉盡上於頭鼻為呼吸之所故鼻柱壞而  
色惡皮膚破而潰爛也脉要精微論曰脉風成為癰風  
寒客於脉而不去名曰癰風或名曰寒熱

始為寒熱熱成曰癰風

新校正云按別本成一作盛

以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁

傷於風者為心風以季夏戊己傷於邪者為脾風以秋

庚辛中於邪者為肺風以冬壬癸中於邪者為腎風

甲春

乙木肝主之夏丙丁火心主之季夏戊己土脾主之秋庚辛金肺主之冬壬癸水腎主之風中五藏

六府之俞亦為藏府之風各入其門戶所中則為偏風

隨俞左右而偏風氣循風府而上則為腦風風入係頭

則為目風眼寒風府穴名正入項髮際一寸大筋內宛

戶也腦戶者督脉足太陽之會故循風府而上則為腦風也足太陽之脉者起於目內眥上額交巔上入絡腦

還出故風入係頭飲酒中風則為漏風熱鬱腠理中風

則為目風眼寒也故曰漏風經入房汗出中風則為內風內耗其精外開

故名曰酒風故曰內風經新沐中風則為首風沐髮中風舍於久風

入中則為腸風飧泄

風在腸中上熏於胃故食不化而下出焉飧泄者食不化而出也

新校正云按全元起云飧泄者水穀不分為利

外在腠理則為泄風

風居腠理則玄府開

通風薄汗泄故云泄風

故風者百病之長也至其變化乃為他病

也無常方然致有風氣也

長先也先百病而有也校正云按全元起本及甲乙

新

經致字作故攻

帝曰五藏風之形狀不同者何願聞其診及其

病能

診謂可言之證能謂內作病形

岐伯曰肺風之狀多汗惡風色緋

然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉上其色白

凡

多風氣則熱有餘熱則腠理開故多汗也風薄於內故惡風焉緋謂薄白色也肺色白在變動為欬主藏氣風

內迫之故色餅然白時款短氣也晝則陽氣在表故差  
暮則陽氣入裏風內應之故甚也眉上謂兩眉間之上

關庭之部所以外司肺  
候故診在焉白肺色也心風之狀多汗惡風焦絕善怒

嚇赤色病甚則言不可快診在口其色赤

焦絕謂唇焦而文理斷絕

也何者熱則皮剝故也風薄於心則神亂故善怒而嚇  
人也心脉支別者從心系上俠咽喉而主舌故病甚則  
言不可快也口唇色赤故診在焉赤者肝風之狀多汗  
心色也新校正云按甲乙經無嚇字

惡風善悲色微蒼噤乾善怒時憎女子診在目下其色

青肝病則心藏無養心氣虛故善悲肝合木木色蒼故  
色微蒼也肝脉者循股陰入髦中環陰器抵少腹俠

胃屬肝絡膈上貫鬲布脅肋循喉嚨之後入頤頤上出  
頤與督脉會於巔其支別者從目系下故噤乾善怒時



憎女子診在目脾風之狀多汗惡風身體怠墮四支

下也青肝色也

不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃

脾脉起於足上循脣

骨又上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本  
散舌下其支別者復從胃別上鬲注心中心脉出於手  
循臂故身體怠墮四支不欲動而不嗜食脾氣合土主  
中央鼻於面部亦居中故診在馬黃脾色也新校正  
云按王注脾風不當引心脉出於手循臂七字  
於義無取脾主四支脾風則四支不欲動矣

腎風之

狀多汗惡風面瘡然浮腫脊痛不能正立其色焔隱曲

不利診在肌上其色黑

瘡然言腫起也焔黑色也腎者陰也目下亦陰也故腎藏受風

則面瘡然而浮腫腎脉者起於足下上循腓內出臍內  
廉上股內後廉貫脊故脊痛不能正立也隱曲者謂隱

蔽委曲之處也腎藏精外應交接今藏被風薄精氣內微故隱蔽委曲之事不通利所為也陰陽應象大論曰氣歸精精食氣今精不足則氣內歸精氣不注皮故肌皮上黑也黑腎色也胃風之狀頸多

汗惡風食飲不下膈塞不通腹善滿失衣則腹脹食寒

則泄診形瘦而腹大

胃之脉支別者從頤後下廉過人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾

其直行者從缺盆下乳內廉下俠齊入氣街中其支別者起胃下口循腹裏至氣街中而合故頸多汗食飲不下膈塞不通腹善滿也然失衣則外寒而中熱故腹脹食寒則寒物薄胃而物不內消故泄利胃合脾而主肉胃氣不足則肉不長故瘦也胃中風氣搖聚故腹大也新校正云按孫思邈云新食竟取風為胃風首

風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以

出內至其風日則病少愈

頭者諸陽之會風客之則皮腠疎故頭面多汗也夫人陽

氣外合於風故先當風一日則病甚以先風甚故亦先衰是以至其風日則病少愈內謂室屋之內也不可以出室屋之內者以頭痛甚而不喜外風故也漏風之新校正云按孫思邈云新沐浴竟取風為首風

狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風

衣常濡口乾善渴不能勞事

脾胃風熱故不可單衣腠理開疎故食則汗出甚則

風薄於肺故身汗喘息惡風衣常濡口乾善渴也形勞則喘息故不能勞事新校正云按孫思邈云因醉取

風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾善渴近衣則身熱如火臨食則汗流如雨骨節懈墮不欲自勞泄風

之狀多汗汗出泄衣上口乾上漬其風不能勞事身

體盡痛則寒

汗上清謂皮上濕如水漬也以多汗出故爾汗多則津液涸故口中乾勞則汗出甚

故不能勞事

身體盡痛以其汗多汗多則亡陽故寒也

新校正云

按孫思邈云新房室竟取風為內風其狀

惡風汗流沾衣裳疑此泄風乃內風也按本論前文先

云漏風內風首風次言入中為腸風在外為泄風今有

泄風而無內風孫思邈載內風乃此

泄風之狀故疑此泄字內之誤也帝曰善

痺論篇第四十三

新校正云按全元起本在第八卷

黃帝問曰痺之安生

安猶何也言何以生

岐伯對曰風寒濕三氣

雜至合而為痺也

雖合而為痺發起亦殊矣

其風氣勝者為行痺寒

氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺也

風則陽受之故為痺行寒則陰受之

故為痺痛濕則皮肉筋脉受之故為痺著  
而不去也故曰痺從風寒濕之所生也  
帝曰其有五

者何也

言風寒濕氣各異則三痺生有五何氣之勝也

岐伯曰以冬遇此者為

骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺以至陰

遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺

冬主骨春主筋夏主脉秋主皮至陰

主肌肉故各為其痺也至陰謂戊己月及土寄王月也

帝曰內舍五藏六府何氣

使然

言皮肉筋脉痺以五時之外遇然內居藏府何以致之

岐伯曰五藏皆有合病

久而不去者內舍於其合也

肝合筋心合脉脾合肉肺合皮腎合骨久病不去則

入於是故骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已復感

於邪內舍於肝脉痺不已復感於邪內舍於心脉痺不

已復感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺

所謂痺者各以其時重感於風寒濕之氣也時謂氣王

王春心王夏肺王秋腎王冬脾王四季之月感謂感應也凡痺之客五藏者肺痺者

煩滿喘而嘔以藏氣應息又其脉還循胃口故使煩滿喘而嘔心痺者脉不通

煩則心下鼓暴上氣而喘噎乾善噫厥氣上則恐心合脉受

邪則脉不通利也邪氣內擾故煩也手心主心包之脉

起於胃中出屬心包下鬲手少陰心脉起於心中出屬

心系下鬲絡小腸其支別者從心系上俠咽喉其直者

也心主為噫以下鼓滿故噫之以出氣也若  
是逆氣上乘於心則恐懼也神懼凌弱故爾  
**肝痺者夜**

**卧則驚多飲數小便上為引如懷**  
肝主驚駭氣相應故中夜卧則驚也肝之

脉循股陰入髀中環陰器抵少腹俠胃屬肝絡膽上貫  
膈布脇肋循喉嚨之後上入頑顙故多飲水數小便上

引少腹如懷妊之狀**腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭**  
腎者胃之

則胃氣不轉故善脹也尻以代踵謂足攣急也脊以代  
頭謂身踠屈也踵足根也腎之脉起於足小指之下斜

趨足心出於然骨之下循內踝之後別入跟中以上膕  
內出膕內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直行者

從腎上貫肝膈入肺中氣不足而受邪故  
不伸屈**脾痺者四支**

**解墮發欬嘔汁上為大塞**  
土王四季外主四支故四支解墮又以其脉起於足循膕

肱上膝股也然脾脉入腹屬腎絡胃上鬲俠咽故腸痺發欬嘔汁脾氣養肺胃復連咽故上為大塞也

者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄

大腸之脉入缺盆絡肺下鬲屬

大腸小腸之脉又入缺盆絡心循咽下鬲抵胃屬小腸今小腸有邪則脉不下鬲脉不下鬲則腸不行化而胃氣積熱故多飲水而不得下出也腸胃中陽氣與邪氣奔喘交爭得時通利以腸氣不化故時或得通則為飧泄胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上

為清涕

膀胱為津液之府胞內居之少腹處關元之中內藏胞器然膀胱之脉起於目內眥上額交巔

上入絡腦還出別下項循肩髃內俠脊抵腰中入循腎絡腎屬膀胱其支別者從腰中下貫膈入脛中今胞受風寒濕氣則膀胱太陽之脉不得下流於足故少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便也小便既澀太陽之



脉不得下行故上燔其腦而為清涕出於鼻竅矣沃猶灌也新校正云按全元起本內痛二字作兩髀陰

氣者靜則神藏躁則消亡

陰謂五神藏也所以說神藏與消亡者言人安靜不涉邪

氣則神氣寧以內藏人躁動觸胃邪氣則神被害而離散藏無所守故曰消亡此言五藏受邪之為痺也飲

食自倍腸胃乃傷

藏以躁動致傷府以飲食見損皆謂過用越性則受其邪此言六府受邪

之為淫氣喘息痺聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺痺也

溺痺聚在腎淫氣之竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾

淫氣謂氣之妄行者各隨藏之所主而入為痺也

新校正云詳從上凡痺之客五藏者至此全元起本在陰陽

別論中此王

諸痺不已亦益內也

從外不去則益深至於身內

其風

氣勝者其人易已也帝曰痺其時有死者或疼久者或

易已者其故何也歧伯曰其入藏者死其留連筋骨間

者疼久其留皮膚間者易已

入藏者死以神去也筋骨疼久以其定也皮膚易已

以浮淺也由斯深淺故有是不同

帝曰其客於六府者何也歧伯曰此

亦其食飲居處為其病本也

四方雖土地溫涼高下不同物性剛柔食居不異但

動過其分則六府致傷陰陽應象大論曰水穀之寒熱感則害六府新校正云按傷寒論曰物性剛柔食居

亦異六府亦各有俞風寒濕氣中其俞而食飲應之循俞

而入各舍其府也

六府俞亦謂背俞也膽俞在十椎之傍胃俞在十二椎之傍三焦俞在十

三推之傍大腸俞在十六椎之傍小腸俞在十八椎之傍  
膀胱俞在十九椎之傍隨形分長短而取之如是各去

脊同身寸之一寸五分並足太陽脉氣之所發也  
新校正云詳六府俞並在本椎下兩傍此注言在椎之傍

者文  
帝曰以鍼治之柰何歧伯曰五藏有俞六府有合

循脉之分各有所發各隨其過

新校正云按甲乙經隨作治

則病瘳

也  
肝之俞曰太衝心之俞曰太陵脾之俞曰太白肺之

足大指間本節後二寸陷者中  
新校正云按刺腰痛注云太衝在足大指本節後內間二寸陷者中動脉應

手  
刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯

太陵在手掌後骨兩筋間陷者中刺可入同身寸之六  
分留七呼若灸者可灸三壯太白在足內側核骨下陷  
者中刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

太淵在手掌後陷者中刺可入同身寸之二分留二呼  
若灸者可灸三壯太谿在足內踝後跟骨上動脈陷者  
中刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯也  
胃合入于三里膽合入于陽陵泉大腸合入于曲池小  
腸合入于小海三焦合入于委陽膀肱合入于委中三  
里在膝下三寸肱外廉兩筋間刺可入同身寸之一寸  
留七呼若灸者可灸三壯陽陵泉在膝下一寸肱外廉  
陷者中刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三  
壯小海在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得  
之刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸五壯曲  
池在肘外輔屈肘曲骨之中刺可入同身寸之五分留  
七呼若灸者可灸三壯委陽在足脛中外廉兩筋間刺  
可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壯屈伸而  
取之委中在脛中央約文中動脈刺可入同身寸之五  
分留七呼若灸者可灸三壯  
新校正云按刺熱注委  
中在足膝後屈處餘並同此  
故經言循脈之分各有所

發各隨其過則病瘳也過謂脉所經過處新校正云詳王氏以委陽為三焦之合按甲乙經云委陽三焦下輔俞也足太陽之別絡三焦之合自在手少陽經天井穴為少陽脉之所入為合詳此六府之合俱引本經所入之穴獨三焦不引本經所入之穴者王氏之誤也王氏但見甲乙經云三焦合于委陽彼說自異彼又以大腸合于巨虛上廉小腸合于下廉此以曲池小海易之故知當以天井穴為合也帝曰榮衛之

氣亦令人痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五

藏灑陳於六府乃能入於脉也

正理論曰穀入於胃脉道乃行水入於經其血

乃成又靈樞經曰榮氣之道內穀為實新校正云按別本實作實穀入於胃氣傳與肺精專者上行經隧由此故水穀精氣合榮故循脉上下貫五藏絡六府也行榮氣運行而入於脉也

脉内故無所不至

衡者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入

於脉也

悍氣謂浮盛之氣也以其浮盛之氣故慄疾滑利不能入於脉中也

故循皮膚之

中分肉之間熏於膏膜散於胃腹

皮膚之中分肉之間謂脉外也膏膜為五

藏之間鬲中膜也以其浮盛故能布散於胃腹之中空虛之處熏其膏膜令氣宣通也

逆其氣則

病從其氣則愈不與風寒濕氣合故不為痺帝曰善痺

或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐

伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也

風寒濕氣客於肉分之間迫切而為沫得

寒則聚聚則排分肉肉裂則痛故有寒則痛也

其不痛不仁者病久入深榮衛

之行瀉經絡時踈故不通

新校正云按甲乙經不通作不痛詳甲乙經此條之不痛

與不仁兩事後言不痛是再明不痛之為重也

皮膚不營故為不仁

不仁者皮頑不知有

無其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也

病本生於風寒濕氣

故陰氣益之也

其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽遭陰故為痺

熱遭遇也

言遇於陰氣陰氣不勝故為熱

其多汗而濡者

此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡

也則中表相應也

帝曰夫痺之為病不痛何也岐伯曰痺在

於骨則重在於脉則血凝而不流在於筋則屈不伸在

於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也凡痺

之類逢寒則蟲逢熱則縱帝曰善

蟲謂皮中如蟲行縱謂縱緩不相就新

校正云按甲

乙經蟲作急

# 痿論篇第四十四

新校正云按全元起本在第四卷

黃帝問曰五藏使人痿何也

痿謂痿弱無力以運動

歧伯對曰肺

主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜

新校正云按全元起

本云膜者人皮下肉上筋膜也

脾主身之肌肉腎主身之骨髓

所主不同痿生

亦各歸其所主

故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿癰也



雙謂擘臂足不得伸以行心氣熱則下脉厥而上上則也肺熱則腎受熱氣故爾

下脉虛虛則生脉痿樞折挈脛縱而不任地也

心熱盛則火獨

光火獨光則內炎上腎之脉常下行今火盛而上炎用事故腎脉亦隨火炎爍而逆上行也陰氣厥逆火復內燔陰上隔陽下不守位心氣通脉故生脉痿腎氣主足故膝腕樞紐如折去而不相提挈脛筋縱緩而不能任地也

肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣

發為筋痿

膽約肝葉而汁味至苦故肝熱則膽液滲泄膽病則口苦今膽液滲泄故口苦也肝主筋

膜故熱則筋膜乾而攣急發為筋痿也八十一難經曰膽在肝短葉間

脾氣熱則胃乾而

渴肌肉不仁發為肉痿

脾與胃以膜相連脾氣熱則胃液滲泄故乾而且渴也脾主肌

肉今熱薄於內故肌腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減  
肉不仁而發為肉痿

發為骨痿

腰為腎府又腎脉上股內貫脊屬腎故腎氣熱則腰脊不舉也腎主骨髓故熱則骨枯而

髓減發則為骨痿

帝曰何以得之岐伯曰肺者藏之長也為心

之蓋也

位高而布葉於胃中是故為藏之長心之蓋

有所失亡所求不得則

發肺鳴鳴則肺熱葉焦

志苦不暢氣鬱故也肺藏氣氣鬱不利故喘息有聲而肺熱葉

也故曰五藏因肺熱葉焦發為痿躄此之謂也

肺者所以行榮

衛治陰陽故引曰五藏因肺熱而發為痿躄也

悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則

陽氣內動發則心下崩數溲血也

悲則心氣急肺布葉舉而上焦不通榮衛

不散熱氣在中故胞絡絕而陽氣內鼓動發則心下崩  
數澁血也心下崩謂心包內崩而下血也澁謂溺也

新校正云按楊上善云胞絡者心上胞絡之脉也  
也詳經注中胞字俱當作包全本胞又作肌也故本病

曰大經空虛發為肌痺傳為脉痿  
本病古經論篇名也以

心崩澁血故大經空虛脉空則熱內薄衛氣盛榮氣微  
故發為肌痺也先見肌痺後漸脉痿故曰傳為脉痿也

思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發

為筋痿及為白淫  
思想所願為所欲也施寫勞損故為筋痿及白淫也白淫謂白物淫衍如

精之狀男子因澁而下女故下經曰筋痿者生於肝使  
子陰器中絛絛而下也

內也  
謂勞役陰力費竭精氣也有漸於濕以水為事若

有所留居處相濕肌肉濡漬痺而不仁發為肉痿

業惟近濕

居處澤下皆水為事也平者久而猶怠感之者尤甚矣肉屬於脾脾氣惡濕濕著於內則衛氣不榮故肉為痿也故下經曰肉痿者得之濕地也

陰陽應象大論曰地之濕氣感則害皮肉

筋脉此之謂害肉也有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐

內伐則熱舍於腎腎者水藏也今水不勝火則骨枯而

髓虛故足不任身發為骨痿

陽氣內伐謂伐腹中之陰氣也水不勝火以熱舍於

腎中故下經曰骨痿者生於大熱也

腎性惡燥熱反居中熱薄骨乾故骨

痿無帝曰何以別之岐伯曰肺熱者色白而毛敗心熱

者色赤而絡脉溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而

肉蠕動腎熱者色黑而齒槁

各求藏色及所主養而命之則其應也

帝曰

如夫子言可矣論言治痿者獨取陽明何也歧伯曰陽

明者五藏六府之海

陽明胃脉也胃為水穀之海也

主閏宗筋宗筋主

束骨而利機關也

宗筋謂陰髦中橫骨上下之豎筋也上絡胃腹下貫髓尻又經於背腹上

頭項故云宗筋主束骨而利機關也然腰者身之大關節所以司屈伸故曰機關

衝脉者經脉

之海也

靈樞經曰衝脉者十二經之海

主滲灌谿谷與陽明合於宗筋

尋此則橫骨上下齊兩傍豎筋正宗筋也衝脉循腹俠齊傍各同身寸之五分而上陽明脉亦俠齊傍各同身

寸之一寸五分而上宗筋脉於中故云與陽明合於宗筋也以為十二經海故主滲灌穀谷也肉之大會為谷

小會為谿新校正云詳宗筋脉於中一作宗筋縱於中陰陽總宗筋之會會於氣

街而陽明為之長皆屬於帶脉而絡於督脉宗筋脉會於橫骨

之中從上而下故云陰陽總宗筋之會也宗筋俠齊下合於橫骨陽明輔其外衛脉居其中故云會於氣街而

陽明為之長也氣街則陰髻兩傍脉動處也帶脉者起於季脇回身一周而絡於督脉也督脉者起於闕元上

下循腹故云皆屬於帶脉而絡於督脉也督脉任脉衛脉三脉者同起而異行故經文或參差而引之故

陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也陽明之脉從缺盆下

乳內廉下俠齊至氣街中其支別者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀抵伏兔下入膝腘中下循衛

外廉下足跗入中指內間其支別者下膝三寸而別以下入中指外間故陽明虛則宗筋縱緩帶脉不引而足痿弱不可用也引謂牽引帝曰治之柰何歧伯曰各補其榮而通其

俞調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月則病

已矣帝曰善

時受月謂受氣時月也如肝王甲乙心王丙丁脾王戊己肺王庚辛腎王壬癸皆王

氣法也時受月則正謂五常受氣月也

厥論篇第四十五

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰厥之寒熱者何也

厥謂氣逆上也世謬傳為脚氣廣設方論焉

歧

伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥

陽謂足之三陽脉陰謂足之三陰脉下謂足也帝曰熱厥之為熱也必起於足

下者何也

陽主外而厥在內故問之

岐伯曰陽氣起於足五指之表

陰脉者集於足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱也

大約而言之足太陽脉出於足小指之端外側足少陽脉出於足小指次指之端足陽明脉出於足中指及大指之端並循足陽而上肝脾腎脉集於足下聚於足心陰弱故足下熱也新校正云按甲乙經陽氣起於足

作走於足起當作走

帝曰寒厥之為寒也必從五指而上於膝者

何也

陰主內而厥在外故問之

岐伯曰陰氣起於五指之裏集於膝

下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也



不從外皆從內也

亦大約而言之也足太陰脉起於足大指之端內側足厥陰脉起於足大

指之端三毛中足少陰脉起於足小指之下斜趣足心並循足陰而上循股陰入腹故云集於膝下而聚於膝

之上帝曰寒厥何失而然也歧伯曰前陰者宗筋之所

聚太陰陽明之所合也

宗筋俠齊下合於陰器故云前陰者宗筋之所聚也太陰者脾

脉陽明者胃脉脾胃之脉皆輔近宗筋故云太陰陽明之所合新校正云按甲乙經前陰者宗筋之所聚作

厥陰者衆筋之所聚全元起云前陰者厥陰也與王注義異亦自一說

春夏則陽氣多而

陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰

此乃天之常道此人者質壯

以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因

從之而上也

質謂形質也奪於所用謂多欲而奪其精氣也

氣因於中

新校正云按甲

乙經氣因於中作所中

陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣

獨在故手足為之寒也帝曰熱厥何如而然也

溯其所由爾

歧伯曰酒入於胃則絡脉滿而經脉虛脾主為胃行其

津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和

則精氣竭精氣竭則不營其四支也

前陰為太陰陽明之所合故胃不和

則精氣竭也內精不足故四支無氣以營之

此人必數醉若飽以入房氣聚

於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱偏於

身內熱而溺赤也夫酒氣盛而慄悍腎氣日衰陽氣獨

勝故手足為之熱也

醉飽入房內亡精氣中虛熱入由是腎衰陽盛陰虛故熱生於手足

也帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠

至一日乃知人者何也

暴猶卒也言卒然胃悶不醒覺也不知人謂悶甚不知識人也

或謂尸厥岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣

盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則

不知人也

陰謂足太陰也盛於上五字作腹滿二字當從甲乙經之

新校正云按甲乙經陽氣

說何以言之別按甲乙經云陽脉下墜陰脉上爭發尸厥焉有陰氣盛於上而又言陽氣盛於上又按張仲景

云少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃鬲宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥仲景言陽氣退下則是陽氣不得盛於上故謂當從甲乙經也又王注陰謂足太陰亦為未盡按繆刺論云邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而形無知其狀若尸或曰尸帝曰善願聞六經脉之厥狀厥焉得專解陰為太陰也

病能也

為前問解故請備聞諸經厥也

岐伯曰巨陽之厥則腫首頭重

足不能行發為眴仆

巨陽太陽也足太陽脉起於目內眥上額交巔上其支別者從巔至

耳上角其直行者從巔入絡腦還出別下項循肩髃內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支別者從腰中下貫膂入膈中其支別者從膂內左右別下貫脾過解樞循髀外後廉下合膈中以下貫膈內出外踝之後循京

骨至小指之端外側由是厥陽明之厥則癰疾欲走呼逆外形斯證也腫或作踵非

腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言

足陽明脉起於鼻交頰中下循鼻外

入上齒中還出俠口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下鬲屬胃絡脾其直行者從缺盆下乳內廉下俠齊入氣街中其支別者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀抵伏兔下入膝臑中下循鼈外廉下足跗入中指內間其支別者下膝三寸而別以下入中指外間其支別者跗上少陽之入大指間出其端故厥如是也癰一為巔非

厥則暴聾頰腫而熱脇痛鼈不可以運

足少陽脉起於目銳眇上抵頭

角下耳後循頸行手少陽之前至肩上交出手少陽之後入缺盆其支別者從耳後入耳中出走耳前至目銳

皆後其支別者目銳眇下大迎合手少陽於頰下加頰  
車下頸合缺盆以下胷中貫鬲絡肝屬膽循脇裏出氣  
街遠髮際橫入髀厭中其直行者從缺盆下掖循胃過  
季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下入外輔骨  
之前直下抵絕骨之端下出外踝之前  
循足跗出小指次指之端故厥如是  
太陰之厥則腹

滿臍脹後不利不欲食食則嘔不得卧

足太陰脉起於大指之端上膝

股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下其支別者復從胃別上鬲注心中故厥如是

少陰

之厥則口乾溺赤腹滿心痛

足少陰脉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直行者

從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本其支別者從肺出絡心注胷中故厥如是

厥陰之厥則

少腹腫痛腹脹溼洩不利好卧屈膝陰縮腫脣內熱足

陰脉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循  
股陰入髀中下環陰器抵少腹俠胃屬肝絡膽上貫膈  
故厥如是矣肱內熱一本云盛則瀉之虛則補之不盛  
肱外熱傳寫行書內外誤也

不虛以經取之

不盛不虛謂邪氣未盛真氣未虛如是則以兗俞經法留呼多少而取之太

陰厥逆鼕急攣心痛引腹治主病者

足太陰脉起於大指之端循指內側

上內踝前廉上膈內循肱骨後上膝股內前廉入腹其  
支別者復從胃別上膈注心中故鼕急攣心痛引腹也  
太陰之脉行有左右候其有過者當發取之故言治主  
病者新校正云詳從太陰厥逆至篇末全元起本在  
第九卷王少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

以其脉從

腎上貫肝膈入肺厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫言

新校

正云按全元起云謔言者氣虛獨言也

### 治主病者

以其脉循膈入鬚中環陰器復上循喉嚨之

後絡舌本故如是

新校正云按甲乙經厥陰之經不絡舌本王氏注刺熱篇刺腰痛篇并此三注俱云絡舌

本又注風論痺論各不云絡舌本

三陰俱逆不得前後

使人手足寒三日死

三陰絕故

太陽厥逆僵仆嘔血善

衄治主病者

以其脉起目內眦又循脊絡腦故如是

少陽厥逆機關不利

機關不利者腰不可以行項不可以顧

以其脉循頸下繞鬚際橫入解

厥中故如是

發腸癰不可治驚者死

足少陽脉貫鬲絡肝屬膽循脇裏出氣街發腸

癰則經氣絕故不可治驚者死也

陽明厥逆喘欬身熱善驚衄嘔血

其



脉循喉嚨入缺盆下  
手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治

主病者

手太陰脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺故如是

手心主少陰厥

逆心痛引喉身熱死不可治

手心主脉起於胃中出屬心包手少陰脉其支別者

從心系上俠咽喉故如是

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不

可以俛仰治主病者

手太陽脉支別者從缺盆循頸上頰至目銳眇却入耳中其支別者從頰

上頰抵鼻至目內眦故耳聾泣出項不可以顧也腰不可以俛仰脉不相應恐古錯簡文

手陽明少

陽厥逆發喉痺噤腫瘰治主病者

手陽明脉支別者從缺盆上頸手少陽脉

支別者從臑中上出缺盆上項故如是  
新校正云按全元起本瘰作瘰



黃帝內經素問卷十二

黃帝內經素問卷十二音釋

風論癘

音利潰

胡對切

腦

奴皓切

痺論育

音荒

痿論躄

必亦切

髀

音寬尻

枯焚切

摠

音總

厥論顛

於交切

譫

音詹僵

居良切

仆

音赴髦

毛音

黃帝內經素問卷十二音釋

欽定四庫全書薈要卷一萬四百三十九子部

黃帝內經素問卷十三

唐王冰次註

宋林億等校正

病能論

奇病論

大奇論

脉解篇

病能論篇第四十六

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰人病胃脫癰者診當何如歧伯對曰診此者

當候胃脉其脉當沈細沈細者氣逆

胃者水穀之海其血盛氣壯今反脉

沈細者是逆常平也

新校正云按

逆者人迎甚盛甚

盛則熱

沈細為寒寒氣格陽故人迎脉盛人迎者陽明之脉故盛則熱也人迎謂結喉傍脉動應手者

人迎者胃脉也

胃脉循喉嚨而入缺盆故云人迎者胃脉也

逆而盛則熱聚

於胃口而不行故胃脘為癰也

血氣壯盛而熱內薄之兩氣合熱故結為癰也

帝曰善人有卧而有所不安者何也岐伯曰藏有所傷

及精有所之寄則安故人不能懸其病也

五藏有所傷損及水穀之

精氣有所之寄扶其下則卧安以傷及於藏故人不能懸其病處於空中也新校正云按甲乙經精有所之

寄則安作情有所倚則卧不安太素作精有所倚則不安帝曰人之不得偃卧者何

也謂不得仰卧也歧伯曰肺者藏之蓋也居高布葉四藏下之故言肺者藏之蓋也

肺氣盛則脉大脉大則不得偃卧肺氣盛滿偃卧則氣促喘奔故不得偃卧

也論在奇恒陰陽中奇恒陰陽上古經篇名世本闕帝曰有病厥者診

右脉沈而緊左脉浮而遲不然病主安在不然言不沈也新校正

云按甲乙經不然作不知歧伯曰冬診之右脉固當沈緊此應四時

左脉浮而遲此逆四時在左當主病在腎頗關在肺當

腰痛也以冬左脉浮而遲浮為肺脉故言頗關在肺也腰者腎之府故腎受病則腰中痛也帝曰



何以言之歧伯曰少陰脉貫腎絡肺今得肺脉腎為之

病故腎為腰痛之病也

左脉浮遲非肺來見以左腎不足而脉不能沈故得肺脉腎為

病也帝曰善有病頸癰者或石治之或鍼灸治之而皆已

其真安在

言所攻則異所愈則同欲聞真法何所在也

歧伯曰此同名異等

者也

言雖同曰頸癰然其皮中別異不一等也故下云

夫癰氣之息者宜以鍼

開除去之夫氣盛血聚者宜石而寫之此所謂同病異

治也

息癰也死肉也石砭石也可以破大癰出膿今以鉋鍼代之

帝曰有病怒狂者

新校正云按太素怒狂作善怒

此病安生歧伯曰生於陽也帝曰陽何

以使人狂

怒不慮禍故謂之狂

岐伯曰陽氣者因暴折而難決故

善怒也

病名曰陽厥

言陽氣被折鬱不散也此人多怒亦曾因暴折而心不疏暢故爾如

是者皆陽逆躁極所生故病名陽厥

帝曰何以知之岐伯曰陽明者常動

巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也

言頸項之脉皆動不止也

陽明常動者動於結喉傍是謂人迎氣舍之分位也若

少陽之動動於曲頰下是謂天憲天牖之分位也若巨

陽之動動於項兩傍大筋前陷者中是謂天柱天容之

分位也不應常動而反動甚者動當病也

新校正云

詳王注以天牖為少陽之分位天容為太陽之分位按

甲乙經天牖乃太陽脉氣所發天容乃少陽脉氣所發

二位交互當以

帝曰治之奈何岐伯曰奪其食即已夫

甲乙經為正也

食入於陰長氣於陽故奪其食即已

食少則氣衰故節去其食即病自止

新校正云按甲乙經奪作衰大素同也

使之服以生鐵洛為飲

新校正云按甲乙經

鐵洛作鐵落為飲作為後飯

夫生鐵洛者下氣疾也

之或為人傳文誤也鐵洛味辛

微溫平主治下氣方俗或呼為鐵漿非是生鐵液也

帝曰善有病身熱解墮汗出

如浴惡風少氣此為何病歧伯曰病名曰酒風

飲酒中風者也

風論曰飲酒中風則為漏風是亦名漏風也夫極飲者陽氣盛而腠理疎玄府開發陽盛則筋痿弱故身體解

墮也腠理疎則風內攻玄府發則氣外泄故汗出如浴也風氣外薄膚腠復開汗多內虛痺熱熏肺故惡風少

氣也因酒而病故曰酒風

帝曰治之柰何歧伯曰以澤瀉朮各十分

麤銜五分合以三指撮為後飯

木味甘平主治大風止汗麤銜味甘寒平主

治風濕筋痿澤瀉味甘寒平主治風濕益氣由此功用方故先之飯後藥先謂之後飯

所謂深之

細者其中手如鍼也摩之切之聚者堅也博者大也上

經者言氣之通天也下經者言病之變化也金匱者決

死生也揆度者切度之也奇恒者言奇病也所謂奇者

使奇病不得以四時死也恒者得以四時死也

新校正云按楊

上善云得病傳之至於勝時而死此為恒中生喜怒令病次傳者此為奇

所謂揆者方切求

之也言切求其脉理也度者得其病處以四時度之也

凡言所謂者皆釋未了義今此所謂尋前後經文悉不  
與此篇義相接似今數句少成文義者終是別釋經文  
世本既闕第七二篇應彼闕經  
錯簡文也古文斷裂謬續於此

奇病論篇第四十七

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰人有重身九月而瘖此為何也

重身謂身中有身則懷妊

者也瘖謂不得言語也妊娠九月足少陰脉養胎約氣斷則瘖不能言也

歧伯對曰胞之絡

脉絕也

絕謂脉斷絕而不通流而不

帝曰何以言之歧

伯曰胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言

少陰腎脉也氣不能言帝曰治之奈何歧伯曰無治也當十

營養故舌不能言

月復

十月胎去胞絡復通腎脉上營故復舊而言也

刺法曰無損不足益有餘

以成其疹

疹謂火病也反法而治則胎死不去遂成火因之疹病也

然後調之

新校正云

按甲乙經及太素無此四字按全元起注云所謂不治者其身九月而瘖身重不得為治湏十月滿生後復如常也然後調之則此四字本全元起注文誤書於此當刪去之

所謂無損不足者身羸

瘦無用饒石也

姓娠九月筋骨瘦勞力少身重又拒無於穀故身形羸瘦不可以饒石傷也

益其有餘者腹中有形而泄之泄之則精出而病獨擅

中故曰疹成也

胎約胞絡腎氣不通因而泄之腎精隨出精液內竭胎則不全胎死腹中著而

不去由此獨擅故疹成焉

帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是為何

病歧伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺積為導

引服藥藥不能獨治也

腹中無形脇下逆滿頻歲不愈息且形之氣逆息難故名息積

也氣不在胃故不妨於食也灸之則火熱內燍氣化為風刺之則必傷其經轉成虛敗故不可灸刺是可積為導引使氣流行久以藥攻內消瘀積則可矣若獨憑其藥而不積為導引則藥亦不能獨治之也

帝曰

人有身體髀股肱皆腫環齊而痛是為何病歧伯曰病

名曰伏梁

以衝脉病故名曰伏梁然衝脉者與足少陰之絡起於腎下出於氣街循陰股內廉斜入

膈中循肱骨內廉並足少陰經下入內踝之後入足下其上行者出齊下同身寸之三寸關元之分俠齊直上循腹各行會於咽喉故身體髀皆腫繞齊而痛名曰伏梁環謂圓繞如環也

此風根也其氣

溢於大腸而著於育育之原在齊下故環齊而痛也

大腸

廣腸也經說大腸當言迴腸也何者靈樞經曰迴腸當齊右環迴周葉積而下廣腸附脊以受迴腸左環葉積上下辟大尋此則是迴腸非可言大腸也然大

腸迴腸俱與肺合從合而命故通曰大腸也不可動之

動之為水溺瀦之病也

以衝脉起於腎下出於氣街其上行者起於胞中上出齊下關

元之分故動之則為水而溺瀦也動謂齊其毒藥而擊動之使其大下也此一問答之義與腹中論同以為奇

病故重帝曰人有尺脉數甚筋急而見此為何病

筋急謂掌

後尺中兩筋急也脉要精微論曰尺外以候腎尺裏以候腹中今尺脉數急脉數為熱熱當筋緩反尺中筋急而見腹中筋當急故問為病乎岐伯曰此所謂疹筋是

靈樞經曰熱即筋緩寒則筋急



人腹必急白色黑色見則病甚

腹急謂俠齊堅筋俱急以尺裏候腹中故見尺

中筋急則必腹中拘急矣色見謂見於面部也夫相五色者白為寒黑為寒故二色見病彌甚也

帝曰

人有病頭痛以數歲不已此安得之名為何病

頭痛之疾不當

踰月數年不愈故怪而問之也

歧伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者

以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛

夫腦為髓主齒是骨餘腦逆反寒骨亦寒

入故令頭痛齒亦痛

病名曰厥逆帝曰善

全注人先生於腦緣有腦則有骨髓齒者骨之

本也帝曰有病口甘者病名為何何以得之歧伯曰此五

氣之溢也名曰脾痺

痺謂熱也脾熱則四藏同稟故五氣上溢也生因脾熱故曰脾痺

夫五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令

人口甘也

脾熱內滲津液在脾胃穀化餘精氣隨溢口通脾氣故口甘津液在脾是脾之濕

此

肥美之所發也

新校正云按太素發作致

此人必數食甘美而多肥

也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為消

渴

食肥則腠理密陽氣不得外泄故肥令人內熱甘者性氣和一而發散逆故甘令人中滿然內熱則陽氣

炎上炎上則欲飲而噤乾中滿則陳氣有餘有餘則脾氣上溢故曰其氣上溢轉為消渴也陰陽應象大論曰

辛甘發散為陽靈樞經曰甘多食之令人悶然從中滿以生之

新校正云按甲乙經消渴作消瘧

治之

以蘭除陳氣也

蘭謂蘭草也神農曰蘭草味辛熱平利水道辟不祥胃中痰癖也除謂去也陳

謂久也言蘭除陳久甘肥不化之氣者以辛能發散故也藏氣法時論曰辛者散也新校正云按本草蘭平

不言熱也帝曰有病口苦取陽陵泉口苦者病名為何何以

得之歧伯曰病名曰膽痺亦謂熱也膽汁味苦故口苦新校正云按全元起本及

太素無口苦取陽陵泉六字詳前後文勢疑此為誤夫肝者中之將也取決於膽

咽為之使者靈蘭秘典論曰肝者將軍之官謀慮出焉膽

故諸謀慮取決於膽咽膽相應故咽為使焉新校正云按甲乙經曰膽者中精之府五藏取決於膽咽為之

使疑此文誤此人者數謀慮不決故膽虛氣上溢而口為之

苦治之以膽募俞胃腹曰募背脊曰俞膽募在乳下二肋外期門下同身寸之五分俞在脊

第十推下兩傍相去各同身寸之一寸半治在陰陽十二官相使中

言治法具於彼

篇今經已亡

帝曰有瘥者一日數十洩此不足也身熱如炭

頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也

是陽氣太盛於外陰氣不

足故有餘也新校正云詳此十五字舊作文寫按甲乙經太素並無此文再詳乃是全元起注後人誤書於

此今作太陰脉微細如髮者此不足也其病安在名為

何病瘥小便不得也洩小便也頸膺如格言頸與胃膺如相格拒不順應也人迎躁盛謂結喉兩傍脉動

盛滿急數非常躁速也胃脉也太陰脉微細如髮者謂手大指後同身寸之一寸骨高脉動處脉則肺脉也此

正手太陰脉氣之所歧伯曰病在太陰其盛在胃頗在

涼可以候五藏也

肺病名曰厥死不治

病瘧數洩身熱如炭頸膺如格息氣逆者皆手太陰脉當洪大而數

今太陰脉反微細如髮者是病與脉相反也何以致之肺氣逆陵於胃而為是上使人迎躁盛也故曰病在太

陰其盛在胃也以喘息氣逆故云頗亦在肺也病因氣逆證不相應故病名曰厥死不治也

此所謂

得五有餘二不足也帝曰何謂五有餘二不足歧伯曰

所謂五有餘者五病之氣有餘也二不足者亦病氣之

不足也今外得五有餘內得二不足此其身不表不裏

亦正死明矣

外五有餘者一身熱如炭二頸膺如格三人迎躁盛四喘息五氣逆也內二不足者

一病瘧一日數十洩二太陰脉微細如髮夫如是者謂其病在表則內有二不足謂其病在裏則外得五有餘

表裏既不可馮補，爲固難爲法。故曰：此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病，顛

疾者，病名曰何安所得之？

夫百病者皆生於風雨寒暑陰陽喜怒也。然始生有形，未

犯邪氣已有顛疾，豈邪氣素傷邪？故問之。顛謂上顛則頭首也。

岐伯曰：病名爲胎病，此

得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并

居，故令子發爲顛疾也。

精氣謂陽之精氣也。

帝曰：有病，瘵然如有

水狀，切其脉大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名爲

何病？

瘵然謂面目浮起而色雜也。大緊謂如弓弦也。大即爲氣緊，即爲寒寒氣內薄而反無痛，與衆別異。

常故問之也。

岐伯曰：病生在腎，名爲腎風。

脉如弓弦大而且緊，勞氣內穢，寒復

內爭勞氣薄寒故化為風風勝於腎故曰腎風腎風而不能食善驚驚已心氣

痿者死

腎水受風心火痿弱火水俱困故必死

帝曰善

大奇論篇第四十八

新校正云按全元起本在第九卷

肝滿腎滿肺滿皆實即為腫

滿謂脉氣滿實也腫謂癰腫也藏氣滿乃如是

之雍喘而兩胠滿

肺藏氣而外主息其脉支別者從肺系橫出腋下故喘而兩胠滿也

新校正云詳肺雍肝雍

肝雍兩胠滿卧則驚不得小便

肝

腎雍甲乙經俱作癰脉循股陰入髀中環陰器抵少腹上貫肝鬲布腎雍脚

脇肋故胠滿不得小便也

肝主驚駭故卧則驚腎雍脚

下至少腹滿

新校正云按甲乙經脚下作胠下

脛有大

脚當作胠不得言脚下至少腹也

小髀骭大跛易偏枯

衝脉者經脉之海與少陰之絡俱起於腎下出於氣街循陰股內廉

斜入腠中循髀骨內廉並少陰之經下入內踝之後入足下其上行者出齊下同身寸之三寸故如是若血氣

變易為心脉滿大痼瘕筋攣

心脉滿大則肝氣下流熱氣內薄筋乾血涸故痼瘕

而筋肝脉小急痼瘕筋攣

肝養筋內藏血肝氣受寒故痼瘕而筋攣筋攣而筋攣脉小急者寒也

肝脉驚暴有所驚駭

驚謂馳驚言其迅急也陽氣內薄故發為驚也

脉不至若

瘖不治自己

又肝氣若厥厥則脉不通厥退則脉復通矣又其脉布脇肋循喉嚨之後故脉不至若

瘖不治自己腎脉小急肝脉小急心脉小急不鼓皆為瘖急

為寒甚不鼓則血不流血不流而寒薄故血內凝而為瘖也

腎肝并沈為石水

肝脉入陰



內貫小腹腎脉貫脊中絡膀胱兩藏并藏氣熏衝脉自腎下絡於胞今水不行化故堅而結然腎主水水冬水

水宗於腎腎象水而沈故氣并而沈名為石水新校正云詳腎肝並沈至下并小弦欲驚全元起本在厥論

中王氏并浮為風水脉浮為風下焦主水并虛為死為腎

移於此五藏之根肝為發生之主二并小絃欲驚脉小絃為肝

者不足是生主俱微故死腎脉大急沈肝脉大急沈皆為疝疝者寒氣結聚之所

急為痛氣實寒薄聚故為絞痛為疝心脉搏滑急為心疝肺脉沈搏為肺

疝皆寒薄於藏故也三陽急為瘕三陰急為疝太陽受寒血凝為瘕太陰受寒

氣聚為疝二陰急為癰厥二陽急為驚二陰少陰也二陽陽明也新校正云詳

二陽急為癡至此全元起  
本在厥論王氏移於此

脾脉外鼓沈為腸澼久自己

外鼓謂鼓動於臂外也

肝脉小緩為腸澼易治

肝脉小緩為脾

腎

脉小搏沈為腸澼下血

小為陰氣不足搏為陽氣

血温

身熱者死

血温身熱是陰氣喪敗故死

心肝澼亦下血

肝藏血心養血故澼皆下

血也二藏同病者可治

心火肝木木火相生故可治之

其脉小沈瀦為腸

澼心肝脉小而沈瀦者澼也

其身熱者死熱見七日死

腸澼下血而身熱者是火

氣內絕去心而歸於外也故死火成數七故七日死

胃脉沈鼓瀦胃外鼓大心脉

小堅急背脊偏枯

外鼓謂不當尺寸而鼓擊於臂外側也

男子發左女子

發右

陽主左陰主右故爾陰陽應象大論曰左右者陰陽之道路此其義也

不瘖舌轉可

治三十日起

偏枯之病瘖不能言腎與胞脉內絕也胞脉繫於腎腎之脉從腎上貫肝鬲入肺中

循喉嚨俠舌本故氣內絕則瘖不能言也

其從者瘖三歲起

從謂男子發左女子發右也病

順左右而瘖不能言三歲治之乃能起

年不滿二十者三歲死

以其五藏始定血氣

方剛藏始定則易傷氣方剛則甚費易傷甚費故三歲死也

脉至而搏血衄身熱者

死血衄為二脉不應搏今反脉搏是氣極乃然故死

脉來懸鉤浮為常脉

以其為血

衄者之脉至如喘名曰暴厥

喘謂卒來盛急去而便衰如人之喘狀也

暴厥

者不知與人言

所謂暴厥之候如此

脉至如數使人暴驚

脉數為熱熱則

內動肝心故驚

三四日自己

數為心脉木被火干病非肝生不與邪合故三日後四日自除所以

兩者木生數三也

脉至浮合

如浮波之合後至者凌前速疾而動無常候也

浮合如數

一息十至以上是經氣予不足也微見九十日死脉至

如火新然是心精之予奪也草乾而死

新然之火燄暫暫不定其形而

便絕也

脉至如散葉是肝氣予虛也木葉落而死

如散葉之隨風

不常其狀

新校正云按甲乙經散葉作叢棘

脉至如省客省客者脉塞而鼓

是腎氣予不足也懸去棗華而死

脉塞而鼓謂纔見不行旋復去也懸謂如

懸物物動而絕去也

脉至如丸泥是胃精予不足也榆莢落而死

如珠之轉脉至如橫格是膽氣予不足也禾熟而死

長脉

而堅如橫木脉至如弦縷是胞精予不足也病善言下

霜而死不言可治

肥之脉繫於腎腎之脉俠舌本人氣不足者則當不能言今反善言是真

氣內絕去腎外歸於舌也故死脉至如交漆交漆者左右傍至也微見

三十日死

左右傍至言如澀漆之交左右反戾新校正云按甲乙經交漆作交棘脉至如

涌泉浮鼓肌中太陽氣予不足也少氣味韭英而死

水如

泉之動但出而不入脉至如頽土之狀按之不得是肌氣予不足

也五色先見黑白壘發死

頽土之狀謂浮大而虛與按之則無新校正云按

甲乙經類  
土作委土

脉至如懸雍懸雍者浮揣切之益大是十二

俞之予不足也水凝而死

如類中之懸雍也按全元起本懸雍作懸離元

新校正云

起注云懸離者言脉與肉不相得也

脉至如偃刀偃刀者浮之小急按之

堅大急五藏菀熟寒熱獨并於腎也如此其人不得坐

立春而死

菀積也熟熱也

脉至如丸滑不直手不直手者按之

不可得也是大腸氣予不足也棗葉生而死脉至如華

者令人善恐不欲坐卧行立常聽是小腸氣予不足也

季秋而死

脉至如華謂似華虛弱不可正取也小腸之脉上入耳中故常聽也

脉解篇第四十九

新校正云按全元起本在第九卷

太陽所謂腫腰腓痛者正月太陽寅寅太陽也

腓謂臂肉也正

月三陽生主建寅三陽謂之太陽故曰寅太陽也

正月陽氣出在上而陰氣盛

陽未得自次也

正月雖三陽生而天氣尚寒以其尚寒故曰陰氣盛陽未得自次次謂立王之

次故腫腰腓痛也

以其脉抵腰中入貫臂過髀樞故耳

病偏虛為跛者正

月陽氣凍解地氣而出也所謂偏虛者冬寒頗有不足

者故偏虛為跛也

以其脉循股內後廉合膕中下循腓過外踝之後循京骨至小指外側故

也新校正云詳王氏云其脉循股內殊非按甲乙經太陽流注不到股內股內乃髀外之誤當云髀外後廉

所謂強上引背者陽氣大上而爭故強上也

強上謂顛項禁強也

甚則引背矣所以爾者以其脈從腦出別下項背故也

所謂耳鳴者陽氣萬物盛

上而躍故耳鳴也

以其脈支別者從顛至耳上角故爾

所謂甚則狂顛疾

者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂顛疾也

以其脈上

顛交顛上入絡腦還出其支別者從顛至耳上角故狂顛疾也頂上曰顛

所謂浮為聾者皆

在氣也

亦以其脈至耳故也

所謂入中為瘖者陽盛已衰故為瘖

也陽氣盛入中而薄於胞腎則胞絡腎絡氣不通故瘖也胞之脈繫於腎腎之脈俠舌本故瘖不能言也

內奪而厥則為瘖俳此腎虛也

俳廢也腎之脈與衝脈並出於氣街循陰股內



廉斜入膈中循肝骨內廉及內踝之後入足下故腎氣內奪而不順則舌瘡足廢故云此乃腎虛也新校正云詳王注云腎之脉與衝脉並出按甲乙經是腎絡非腎之脉况王注痿論并奇病論大奇論並云腎之絡則此脉

少陰不至者厥也

少陰腎脉也若腎氣內脫則少陰脉不至也少

陰之脉不至是則太陰之氣逆上而行也

少陽所謂心脇痛者言少陽盛也

盛者心之所表也

心氣逆則少陽盛心氣宜木外鑠肺金故盛者心之所表也

九月陽

氣盡而陰氣盛故心脇痛也

足少陽脉循脇裏出氣街心主脉循胃出脇故爾火

墓於戌故九月陽氣盡而陰氣盛也

所謂不可反側者陰氣藏物也物藏

則不動故不可反側也所謂甚則躍者

躍謂跳躍也

九月萬

物盡衰草木畢落而墮則氣去陽而之陰氣盛而陽之

下長故謂躍

亦以其脉循髀陽出膝外廉下入外輔之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足

附故氣盛則令人跳躍也

陽明所謂洒洒振寒者陽明者午也五月

盛陽之陰也

陽盛以明故云午也五月夏至一陰氣上陽氣降下故云盛陽之陰也

陽盛

而陰氣加之故洒洒振寒也

陽氣下陰氣升故云陽盛而陰氣加之也

所謂

脛腫而股不收者是五月盛陽之陰也陽者衰於五月

而一陰氣上與陽始爭故脛腫而股不收也

以其脉下髀抵伏兔

下入膝髓中下循髓外廉下足附入中指內間又其支別者下膝三寸而別以下入中指外間故爾

所謂

上喘而為水者陰氣下而復上上則邪客於藏府間故

為水也

藏脾也府胃也足太陽脉從足走腹足陽明脉從頭走足今陰氣微下而太陰上行故云陰氣

下而復上也復上則所下之陰氣不散客於脾胃之間化為水也

所謂胃痛少氣者水

氣在藏府也水者陰氣也陰氣在中故胃痛少氣也

水停

於下則氣鬱於上氣鬱於上則肺滿故胃痛少氣也

所謂甚則厥惡人與火聞木

音則惕然而驚者陽氣與陰氣相薄水火相惡故惕然

而驚也所謂欲獨閉戶牖而處者陰陽相薄也陽盡而

陰盛故欲獨閉戶牖而居

惡喧故爾

所謂病至則欲乘高而

歌棄衣而走者陰陽復爭而外并於陽故使之棄衣而

走也

新校正云詳所謂甚則厥至此與前陽明脉解論相通

所謂客孫脉則頭痛

鼻軌腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭

痛鼻軌腹腫也太陰所謂病脹者太陰子也十一月萬

物氣皆藏於中故曰病脹

陰氣大盛太陰始於子故云子也以其脉入腹屬脾絡胃

故病脹也所謂上走心為噫者陰盛而上走於陽明陽明絡

屬心故曰上走心為噫也

按靈樞經說足陽明流注並無至心者太陰脉說云其支

別者復從胃別上膈注心中法應以此絡為陽明絡也  
新校正云詳王氏以足陽明流注並無至心者按甲

乙經陽明之脉上通於心循咽出於口宜其  
經言陽明絡屬心為噫王氏安得謂之無所謂食則

嘔者物盛滿而上溢故嘔也  
以其脉屬脾絡胃上鬲俠咽故也所謂得

後與氣則快然如衰者十二月陰氣下衰而陽氣且出

故曰得後與氣則快然如衰也少陰所謂腰痛者少陰

者腎也十月萬物陽氣皆傷故腰痛也  
少陰者腎脉也

也所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮

無所依從故嘔欬上氣喘也  
以其脉從腎上貫肝鬲入肺中故病如是也所

謂色色  
新校正云詳色色字疑誤不能久立久坐起則目眩眩無所

見者萬物陰陽不定未有主也秋氣始至微霜始下而  
方殺萬物陰陽內奪故目眴眴無所見也所謂少氣善  
怒者陽氣不治陽氣不治則陽氣不得出肝氣當治而  
未得故善怒善怒者名曰煎厥所謂恐如人將捕之者  
秋氣萬物未有畢去陰氣少陽氣入陰陽相薄故恐也  
所謂惡聞食臭者胃無氣故惡聞食臭也所謂面黑如  
地色者秋氣內奪故變於色也所謂欬則有血者陽脉  
傷也陽氣未盛於上而脉滿滿則欬故血見於鼻也厥

陰所謂癰疽婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之

陰邪在中故曰癰疽少腹腫也

以其脉循股陰入髦中環陰器抵少腹故爾

所謂腰脊痛不可以俛仰者三月一振榮華萬物一俛

而不仰也所謂癰疽皮膚脹者曰陰亦盛而脉脹不通

故曰癰疽也所謂甚則噤乾熱中者陰陽相薄而熱

故噤乾也

此一篇殊與前後經文不相連接別釋經脉發病之源與靈樞經流注略同所指殊異

新校正云詳此篇所解多甲乙經是動所生之病雖復少有異處大槩則不殊矣

# 黃帝內經素問卷十三

黃帝內經素問卷十三音釋

病能論解

音墮

徒卧切

撮

子括切

奇病論鑱

鋤銜切

赤

丑刃切

穡

音畜

大奇論𩑦

弋念切

瞥

蒲滅切

揣

初委切

脉解論睢

音誰



黃帝內經素問卷十三音釋

欽定四庫全書薈要卷一萬四百四十

子部

黃帝內經素問卷十四

唐王冰次注

宋林億等校正

刺要論

刺齊論

刺禁論

刺志論

鍼解

長刺節論

刺要論篇第五十

新校正云按全元起本在第六卷刺齊篇中

黃帝問曰願聞刺要岐伯對曰病有浮沈刺有淺深各

至其理無過其道

道謂氣所行之道也

過之則內傷不及則生外

壅壅則邪從之

過之內傷以大深也不及外壅以妄益他分之氣也氣益而外壅故邪氣隨虛

而從之也

淺深不得反為大賊內動五藏後生大病

賊謂私害動謂

動亂然不及則外壅過之則內傷既且外壅內傷是為大病之階漸爾故曰後生大病也

故曰病有

在毫毛腠理者有在皮膚者有在肌肉者有在脉者有

在筋者有在骨者有在髓者

毛之長者曰毫皮之文理曰腠理然二者皆皮之可

見者也

是故刺毫毛腠理無傷皮皮傷則內動肺肺動則

秋病溫瘧泝泝然寒慄

鍼經曰凡刺有五以應五藏一曰半刺半刺者淺內而疾發鍼

令鍼傷多如拔髮狀以取皮氣此肺之應也然此其淺以應於肺腠理毫毛猶應更淺當取髮根淺深之半爾

肺之合皮王於秋氣故肺動則秋病溫瘧泝泝然寒慄也刺皮無傷肉肉傷則內動

脾脾動則七十二日四季之月病腹脹煩不嗜食

脾之合肉

寄王四季又其脉從股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下其支別者復從胃別上鬲注心中故傷肉則動脾脾動則四季之月腹脹煩而不嗜食也七十二日四季之月者謂三月六月九月十二月各十二日後土寄王刺肉無傷脉脉傷則內動心心動則夏病

十八日也

心

心痛心之合脉王於夏氣真心少陰之脉起於心中出屬心系心包心主之脉起於胃中出屬心包平人

氣象論曰藏真通於心故脉刺脉無傷筋筋傷則內動傷則動心心動則夏病心痛

肝肝動則春病熱而筋弛

肝之合筋王於春氣鍼經曰熱則筋緩故筋傷則動肝肝

動則春病熱而筋弛緩弛猶縱緩也刺筋無傷骨骨傷則內動腎腎動則

冬病脹腰痛

腎亦合骨王於冬氣膏為腎府故骨傷則動腎腎動則冬病腰痛也腎之脉直行者

從腎上貫肝

刺骨無傷髓髓傷則銷鑠肝酸體解亦然

不去矣

髓者骨之充鍼經曰髓海不足則腦轉耳鳴肝酸眩冒故髓傷則腦髓銷鑠肝酸體解亦然不

去也銷鑠謂髓腦銷鑠解亦然不可名之也腦髓銷鑠骨空之所

也致

刺齊論篇第五十一

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞刺淺深之分

謂皮肉筋脉骨之分位也

歧伯對曰刺

骨者無傷筋刺筋者無傷肉刺肉者無傷脉刺脉者無

傷皮刺皮者無傷肉刺肉者無傷筋刺筋者無傷骨帝

曰余未知其所謂願聞其解歧伯曰刺骨無傷筋者鍼

至筋而去不及骨也刺筋無傷肉者至肉而去不及筋

也刺肉無傷脉者至脉而去不及肉也刺脉無傷皮者

至皮而去不及脉也

是皆謂遺邪也然筋有寒邪肉有風邪脉有濕邪皮有熱邪則如是

遺之所謂邪者皆言其非順正氣而相干犯也新校  
正云詳此謂刺淺不至所當刺之處也下文則誠其太

深也所謂刺皮無傷肉者病在皮中鍼入皮中無傷肉也

刺肉無傷筋者過肉中筋也刺筋無傷骨者過筋中骨

也此之謂反也

此則誠過分太深也新校正云按全元起云刺如此者是謂傷此皆過過必

損其血氣是謂逆也邪必因而入也

刺禁論篇第五十二

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞禁數岐伯對曰藏有要害不可不察肝

生於左

肝象木王於春春陽發生故生於左也

肺藏於右

肺象金王於秋秋陰收殺故藏

於古也新校正云按楊上善云肝為少陽陽心部於

表陽氣主外腎治於裏陰氣主內腎象水也新校正

故得稱部腎間動氣脾為之使營動不已糟粕胃為之

市水穀所歸五味皆入鬲育之上中有父母鬲育之上

氣者生之原生者命之主故氣海為人之父母也新

校正云按楊上善云心下鬲上為育心為陽父也肺為

陰母也肺主於氣心主於七節之傍中有小心小心謂

血共營衛於身故為父母真心神

靈之宮室新校正云按太素小心作志心楊上善云

脊有三七二十一節腎在下七節之傍腎神曰志五藏

之靈皆名為神神之所以從之有福逆之有咎從謂隨

在得名為志者心之神也順也八



者人之所以生形之所以成  
故順之則福延逆之則咎至  
刺中心一日死其動為噫

心在氣

刺中肝五日死其動為語

肝在氣為語

新校

甲乙經語作欠元起云腎傷則  
刺中腎六日死其動為

噫

腎在氣為噫

新校正云按全

刺中肺三日死其動

為欬

肺在氣

刺中脾十日死其動為吞

肺在氣為吞

新校正云按全

元起本及甲乙經十日作十五日刺中五藏與診要經  
終論并四時刺逆從論相重此叙五藏相次之法以所

生為次甲乙經以心肺肝脾腎為次是以刺中膽一日  
所刺為次全元起本舊文則錯亂無次矣

半死其動為嘔

膽氣勇故為嘔

新校正云按診要經  
終論刺中膽下又云刺中鬲者為傷中

其病雖愈不刺跗上中大脉血出不止死

跗為足跗大脉動而不止

者則胃之大經也胃為水穀之海然血

刺面中溜脉不

幸為盲

面中溜脉者手太陽任脉之交會手太陽脉自顙而斜行至目內皆任脉自鼻軌兩傍上行至

腫子下故刺面中溜脉不幸為盲

刺頭中腦戶入腦立死

腦戶穴名也在枕骨上通

於腦中然腦為髓之海真氣之

刺舌下中脉太過血出

不止為瘡

舌下脉脾之脉也脾脉者俠咽連舌本散舌下血出不止則脾氣不能營運於舌故瘡下

能言刺足下布絡中脉血不出為腫

布絡謂當內踝前足下空處布散之

絡正當然谷穴分也絡中脉則衝脉也衝脉者並少陰之經下入內踝之後入足下也然刺之而血不出則腎

脉與衝脉氣并歸於然谷之中故為腫

**刺却中大脉令人仆脫色**

尋此經却中主

治與中誥流注經委中穴正同應却中者以經穴為名委中處所為名亦猶寸口脉口氣口皆同一處爾然却中大脉者足太陽經脉也足太陽之脉起於目内眦合手太陽手太陽脉自目内眦斜絡於額足太陽脉上頭下項又循於足故刺之過禁則刺氣街中脉血不出為令人仆倒而面色如脫去也

**腫鼠僕**

氣街之中膽胃脉也膽之脉循脇裏出氣街胃之脉俠齊入氣街中其支別者起胃下口循腹

裏至氣街中而合今刺之而血不出則血脉氣并聚於中故內結為腫如伏鼠之形也氣街在腹下俠齊兩傍相去四寸鼠僕上一寸動脉應手也新校正云按別本僕一作臄氣府論注氣街在齊下橫骨兩端鼠臄上一寸  
**刺脊間中髓為偃**  
偃謂偃僂身蹠屈也脊間謂脊骨節間也刺中髓則骨精氣泄

故偃也刺乳上中乳房為腫根蝕乳之上下皆足陽明之

泄胃中氣血皆外湊之然刺中乳房則氣更交湊故為大腫中有膿根內蝕肌膚化為膿水而久不愈刺

缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆五藏者肺為之蓋缺盆

又在氣為欬刺缺盆中內陷則肺氣外泄故令人喘欬逆也刺手魚腹內陷為腫魚手

腹內肺脉所流故刺之內陷則為腫也新校正云按甲乙經肺脉所流當作留字無刺大醉令人

氣亂脉數過度故因刺而亂也無刺大怒令人新校正云按靈樞經氣亂當作脉亂

氣逆怒者氣逆故刺之益甚無刺大勞人經氣越也無刺新飽人氣盛

無刺大饑人氣不足也無刺大渴人血脉乾也無刺大驚人神蕩越而

氣不治也新校正云詳無刺大醉至此七條與靈樞經相出入靈樞經云新內無刺已刺無內大怒無刺已

刺無怒大勞無刺已刺無勞大醉無刺已刺無醉大飽無刺已刺無飽大飢無刺已刺無飢大渴無刺已刺無

渴大驚大恐必定刺陰股中大脉血出不止死陰股之中脾之

其氣乃刺之也脉也脾者中土孤藏以灌四傍今血出不止脾氣將竭故死新校正云按刺陰股中大脉條皇甫士安移在

前刺跗上中大脉下相間自後刺客主人內陷中脉為至篇末逐條與前條相間也

內漏為聾客主人穴名也今名上關在耳前上廉起骨開口有空手少陽足陽明脉交會於中陷脉

言刺太深也刺太深則交脉破決故為耳內之漏脉內漏則氣不營故聾新校正云詳客主人穴與氣穴論注

同按甲乙經及氣穴府論注云手足少陽足陽明三脉之會疑此脫足少陽一脉也刺膝髓出液

為跖

膝為筋府筋會於中液出筋乾故跖

刺臂太陰脉出血多立死

臂太陰者

肺脉也肺者主行榮衛絕故立死也

刺足少陰脉重虛出

血為舌難以言

足少陰腎脉也足少陰脉貫腎絡肺繫舌本故重虛出血則舌難言也

刺

膺中陷中肺為喘逆仰息

肺氣上泄逆所致也

刺肘中內陷氣歸

之為不屈伸

肘中謂肘屈折之中天澤穴中也刺過陷脉惡氣歸之氣固關節故不屈伸也

刺

陰股下三寸內陷令人遺溺

股下三寸腎之絡也衝脉與少陰之絡皆起於腎下

出於氣街並循於陰股其上行者

刺掖下脇間內陷令

出於氣街並循於陰股其上行者刺掖下脇間內陷令

人欬

掖下肺脉也肺之脉從肺系橫出掖下真心藏脉直行者從心系却上掖下刺陷脉則心肺俱動故

數刺少腹中膀胱溺出令人少腹滿

胞氣外泄穀氣歸之故少腹滿也少

腹謂齊下也

刺臍腸內陷為腫

臍腸之中足太陽氣泄故為腫

刺匡上

陷骨中脉為漏為盲

匡目匡也骨中謂目匡骨中也匡骨中脉目之系肝之脉也刺內陷

則眼系絕故為目漏目盲

刺關節中液出不得屈伸

諸筋皆皆屬於節津液滲潤之

液出則筋膜乾故不得屈伸也

刺志論篇第五十三

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞虛實之要岐伯對曰氣實形實氣虛形

虛此其常也反此者病

陰陽應象大論曰形歸氣由是故虛實同焉反謂不相合應失

常平之候也形氣相反故病穀盛氣盛穀虛氣虛此其生氣謂脉氣形謂身形也

常也反此者病

靈樞經曰榮氣之道內穀為實穀入於胃氣傳與肺精專者上行經隧由是故

穀氣虛實占心同焉候不相應則為脉實血實脉虛血病也新校正云按甲乙經實作寶

虛此其常也反此者病

脉者血之府故虛實同焉反不相應則為病也帝曰如

何而反歧伯曰氣虛身熱此謂反也

氣虛為陽氣不足陽氣不足當身寒

反身熱者脉氣當盛脉不盛而身熱證不相符故謂反也新校正云按甲乙經云氣盛身寒氣虛身熱此謂

反也當補穀入多而氣少此謂反也

胃之所出者氣氣而布於經脉也穀

入於胃脉道乃散今穀入多而氣少者是胃氣不散故謂反也穀不入而氣多此謂反



也胃氣外散脉盛血少此謂反也脉少血多此謂反也

經脉行氣絡脉受血經氣入絡絡受經氣候不相合故皆反常也

氣盛身寒得之傷寒

氣虛身熱得之傷暑

傷謂觸冒也寒傷形故氣盛身寒熱傷氣故氣虛身熱

穀入

多而氣少者得之有所脫血濕居下也

脫血則血虛血虛則氣盛內鬱

化成津液流入下焦故云濕居下也

穀入少而氣多者邪在胃及與肺也

胃氣不足肺氣下流於胃中故邪在胃然肺氣入胃則肺氣不自守氣不自守則邪氣從之故云邪在胃及與

肺脉小血多者飲中熱也

飲謂留飲也飲留脾胃之中則脾氣溢脾氣溢則發熱中

脉大血少者脉有風氣水漿不入此之謂也

風氣盛滿則水漿不

入於脉

夫實者氣入也虛者氣出也

入為陽出為陰陰生於內故出陽生於外

故氣實者熱也氣虛者寒也

陽盛而陰內拒故熱陰盛而陽外微故寒

入實

者右手開鍼空也入虛者左手閉鍼空也

言用鍼之補寫也古手持

鍼左手捻穴故實者右手開鍼空以寫之虛者左手閉鍼空以補之也

鍼解篇第五十四

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞九鍼之解虛實之道岐伯對曰刺虛則

實之者鍼下熱也氣實乃熱也滿而泄之者鍼下寒也

氣虛乃寒也菴陳則除之者出惡血也

菴積也陳久也除去也言絡脉

之中血積而久之者邪勝則虛之者出鍼勿按邪者不正之目非本

經氣是則謂邪非言鬼毒精邪之所勝也出徐而疾則

實者徐出鍼而疾按之疾而徐則虛者疾出鍼而徐按

之徐出謂得經氣已久乃出之疾按謂鍼出穴已速疾按之則真氣不泄經脈氣全故徐而疾乃實也疾出

徐緩按之則邪氣得泄精氣復固故疾而徐乃虛也

言實與虛者寒溫氣多少也寒溫謂經脈陰陽之氣也若無若有者

疾不可知也言其冥昧不可即而知也夫不可即知故若無慧然神悟故若育也察後與

先者知病先後也知病先後乃補寫之為虛與實者工勿失其法

鍼經曰經氣已至慎守勿失此之謂也  
校正云按甲乙經云若存若亡為虛與實

新

若得若失

者離其法也

妄為補寫離亂大經誤補實者轉令若得  
誤寫虛者轉令若失故曰若得若失也鍼

經曰無實實無虛虛此其誠也  
至此與太素九鍼解篇經同而解異二經互相發明也  
新校正云詳自篇首

虛實之要九鍼最妙者為其各有所宜也

熱在頭身宜  
鍼在內分氣

滿宜負鍼脉氣虛少宜鍤鍼寫熱出血發泄固病宜鋒  
鍼破癰腫出膿血宜鉋鍼調陰陽去暴痺宜負利鍼治  
經絡中痛痺宜毫鍼痺深居骨解腰脊節膝之間者宜  
長鍼虛風舍於骨解皮膚之間宜大鍼此之謂各有所

宜也

新校正云  
按別本鉋一作鉋

補寫之時者與氣開闔相合也

氣當時刻

謂之開已過未至謂之闔時刻者何水下一刻人氣在  
太陽水下二刻人氣在少陽水下三刻人氣在陽明水

下四刻人氣在陰分水下不已氣行不已如是則當刻者謂之開過刻及未至者謂之闔也鍼經曰謹候其氣之所在而刺之是謂逢時此所謂補寫之時也新校正云詳自篇首至此文出靈樞經素問解之互相發明也甲乙經云補寫之時以九鍼之名各不同形者鍼窮

其所當補寫也

各不同形謂長短鋒穎不等窮其補寫謂各隨其療而用之也新校正云按

九鍼之形今具甲乙經

刺實須其虛者留鍼陰氣隆至乃去鍼也

刺虛須其實者陽氣隆至鍼下熱乃去鍼也

言要以氣至而有効

也經氣已至慎守勿失者勿變更也

變謂變易更謂更改皆變法也言得

氣至必宜謹守无變其法反招損也

深淺在志者知病之内外也

志一為意

皆行鍼之用也

近遠如一者深淺其候等也

言氣雖近遠不同然其測候皆以氣

至而有

如臨深淵者不敢墮也

言氣候補寫如臨深淵不敢墮慢失補寫之法

也手如握虎者欲其壯也

壯謂接鍼堅定也鍼經曰持鍼之道堅者為實則其義也

新校正云按甲乙經實字作寶

神無營於衆物者靜志觀病人無左右

視也

目絕妄視心專一務則用之必中无惑誤也校正云詳從刺實須其虛至此又見寶命全形

新論

此又為之解亦互相發明也

義無邪下者欲端以正也

正指直刺鍼无左右

必

正其神者欲瞻病人目制其神令氣易行也

檢彼精神令无散越

則氣為神使中外易調也

所謂三里者下膝三寸也所謂跗之者

新校

正云按全元起本跗之作低筋太素舉膝分易見也三里

穴名正在膝下三寸筋外兩筋肉分間極重巨虛者蹻

足骹獨陷者巨虛穴名也蹻謂舉也取巨虛下廉當下

廉者陷下者也欲知下廉穴者骹外兩筋之間獨陷下者則其處也帝曰余聞九

鍼上應天地四時陰陽願聞其方令可傳於後世以為

常也岐伯曰夫一天二地三人四時五音六律七星八

風九野身形亦應之鍼各有所宜故曰九鍼新校正云詳此文與

靈樞經相出入人皮應天覆蓋於物人肉應地柔厚安靜人脉

應人

盛衰變易人之象也

人筋應時

時堅固真定之象也

人聲應音

備五音故人

陰陽合氣應律

交會氣通相生无替則律之象新校正云按別本氣一作度

人齒面

目應星

人面應七星者所謂面有七孔應之也新校正云詳此注乃全元起之辭也

人出入

氣應風

動出往來風之象也

人九竅三百六十五絡應野

身形之外野之

象也故一鍼皮二鍼肉三鍼脉四鍼筋五鍼骨六鍼調陰

陽七鍼益精八鍼除風九鍼通九竅除三百六十五節

氣此之謂各有所主也

一鑱鍼二員鍼三鍤鍼四鋒鍼五鉞鍼六員利鍼七毫鍼八長

鍼九大鍼云按別本鉞一作鉞

新校正

人心意應八風

動靜不形風之象也

人氣應



天運行不息人髮齒耳目五聲應五音六律

髮齒生長耳目清通

天之象也

五聲應同故應五音及六律也

人陰陽脉血氣應地

人陰陽有交會生成脉血氣有虛盈

盛衰故應地也

人肝目應之九

肝氣通目木生數三

九竅三

百六十五

新校正云按金元起本无此七字

人一以觀動靜天二以候

五色七星應之以候髮母澤五音一以候宮商角徵羽

六律有餘不足應之二地一以候高下有餘九野一節

俞應之以候閉節三人變一分人候齒泄多血少十分

角之變五分以候緩急六分不足三分寒關節第九分

四時人寒溫燥濕四時一應之以候相反一四方各作

解

此一百二十四字蠹簡爛文義理殘缺莫可尋究而  
上古書故且載之以俾後之具本也

新校正云詳

王氏云一百二十四字今有一百二十三字又亡一字

長刺節論篇第五十五

新校正云按全元起本在第三卷

刺家不診聽病者言在頭頭疾痛為藏鍼之

藏猶深也言深刺之

故下大曰元起本云為鍼之無藏字

新校正云按全元起本云為鍼之無藏字

刺至骨病已上無傷骨肉及

皮皮者道也

皮者鍼之道故刺骨無傷骨肉及皮也

陰刺入一傍四處治

寒熱

數也

新校正云按別本卒刺一作平刺按甲乙

經陽刺者正內一傍內四陰刺者  
左古卒刺之此陰刺疑是陽刺也  
深專者刺大藏寒熱病氣

深專攻中者當  
刺五藏以拒之  
迫藏刺背背俞也迫近也漸近於藏則刺背五藏之俞也

刺之迫藏藏會言刺近於藏者何也  
腹中寒熱去而止

言刺背俞者無問其數  
要以寒熱去乃止鍼  
與刺之要發鍼而淺出血若與

刺之則  
如此  
治腐腫者刺腐上視癰小大深淺刺腐腫謂腫中肉腐敗

為膿血者癰小者淺刺之癰大者深刺之  
新校正云按全元起本及甲乙經腐作癰  
刺大者多血

小者深之必端內鍼為故正癰之大者多出血癰之小者但直鍼之而已  
新校

正云按甲乙經云刺大者多而深之必端  
內鍼為故正也此文云小者深之疑此誤  
病在少腹有

積刺皮髓以下至少腹而止刺俠脊兩傍四椎間刺兩

髂髀季脇肋間導腹中氣熱下已

少腹積謂寒熱之氣結積也皮髓謂齊下

同身寸之五寸橫約文審刺而勿過深之刺禁論曰刺少腹中膀胱溺出令人少腹滿由此故不可深之矣俠

脊四椎之間據經无俞恐當云五椎間五椎之下兩傍正心之俞心應少腹故當言椎間也髂為腰骨髀一為

髀字形相近之誤也髀謂居髂腰側穴也季脇肋間當是刺季肋之間京門穴也新校正云按釋音皮髓作

皮髓苦末反是髂誤作髓也及遍尋篇韻中無髓字只有髂字髂骨端也皮髓者蓋謂齊下橫骨之端也全元

起本作皮髓元起註云病在少腹腹痛不得大小便病

名曰疝得之寒刺少腹兩股間刺腰髀骨間刺而多之

盡炆病已

厥陰之脉環陰器抵少腹衝脉與少陰之絡皆起於腎下出於氣街循陰股其後行者自

少腹以下骨中央女子入繫廷孔其終循陰器合纂間繞纂後別繞腎至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內從廉貫脊屬腎其男子循莖下至纂與女子等故刺少腹及兩股間又刺腰髀骨間也腰髀骨者腰旁俠脊平立陷者中按之有骨處也疝為寒生故多刺之少腹病盡熱乃止鍼炆熱也  
新校正云按別本纂一作基

在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺刺筋上為故刺分

肉間不可中骨也

分謂肉分間有筋維絡處也刺筋无傷骨故不可中骨也

病起筋

炆病已止

筋寒痺生故得筋熱病已乃止

病在肌膚肌膚盡痛名曰肌

痺傷於寒濕刺大分小分多發鍼而深之以熱為故

分大

謂大肉之分小分無傷筋骨傷筋骨癰發若變鍼經曰病

傷良肉皮膚為癰又曰鍼太深則邪氣反沈諸分盡熱病益甚傷筋骨則針太深故癰發若變也

病已止熱可消寒故病在骨骨重不可舉骨髓酸痛寒

氣至名曰骨痺深者刺無傷脉肉為故其道大分小分

骨熱病已止骨痺刺無傷脉肉者何自刺其氣通肉之大小分中也病在諸陽脉

且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂氣狂亂也刺之虛脉視分

盡熱病已止病初發歲一發不治月一發不治月四五

發名曰癰病刺諸分諸脉其無寒者以鍼調之病止新校

正云按甲乙經云刺諸病風且寒且熱炆汗出一日數

分其脉尤寒以鍼補之

過先刺諸分理絡脉汗出且寒且熱三日一刺百日而

已病大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉為故汗出

百日

泄衛氣之怫熱

刺骨髓汗出百日

泄榮氣之怫熱

凡二百日鬚眉

生而止鍼

怫熱屏退陰氣內復故多汗出鬚眉生也

黃帝內經素問卷十四

黃帝內經素問卷十四音釋

刺要論

音素

弛

施是切

鑠

詩若切

眩

縣音

刺齊論解

胡買切

刺禁論

音北

刺志論脫

土活切

捻

涅音

鍼解論

低音

長刺節論

骷光抹切

纂

初患切



黃帝內經素問卷十四音釋

謹案卷十二第二頁後四行脉風成為癘刊本成訛盛據脉要精微論改

第二頁後六行以春甲乙傷於風者為肝風按此一節吳崐本移在下文則為泄風之下

第五頁前六行而物不內消刊本物訛陽今改

第五頁後二行故先當風一日則病甚刊本一訛

二據經文改

第八頁前七行從腰中下貫臀按皇甫謐甲乙經

及本書刺瘡論注貫醫並作貫腫

第八頁後二行陰氣者靜則神藏案此下十九字  
吳崐本移入生氣通天論中

第九頁後八行太白在足內側核骨下按核骨別  
本作覈骨

第十七頁後七行陰謂足太陰也刊本太陰下行  
陽字據下文刪

第十八頁前八行從腰中下貫醫刊本缺醫字據

靈樞經補

第十八頁後八行循頸行手少陽之前按少陽二字刺腰痛論注作陽明此及靈樞甲乙經俱作少陽疑有一誤

卷十三第七頁前四行轉為消渴按吳崐本轉作傳

第十二頁前七行懸去按此二字吳崐本移在上文脉塞而鼓之下

音釋第一頁前三行肱音誰刊本訛作肱音蛆案  
脉解篇腫腰肱痛者注云肱謂臂月與漢書武  
帝紀郊祀志汾陰肱上句顏師古注同彼注云  
肱音誰今據改


卷十四第二頁前五行注心中刊本注訛在中訛  
十據靈樞經改

第四頁前五行心為陽父也刊本缺陽字據下句  
補

第九頁前三行右手開鍼空也刊本右訛左據張  
志聰高世栻吳崐三家本改

第十三頁前六行上無傷骨肉及皮按吳崐本上  
作止連上句讀





總校官候補中書臣吳紹潔

校對官庶吉士臣戴聯奎

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣呂永安

謄錄監生臣趙之璧